

**UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN
FACULTAD DE MEDICINA HUMANA**

ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



Tesis para optar el título profesional de Médico Cirujano:
**CARACTERÍSTICAS CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICAS DEL
RECIÉN NACIDO HIJO DE MADRE ADOLESCENTE
HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA. HUARAL 2014 – 2015**

AUTORES:

AGUEDO PALACIOS, Sandro Jesús

CUIZANO BLAS, Luis Antonio

ASESOR:

BERMEJO SÁNCHEZ, Fredy Ruperto

HUACHO – PERÚ

2016

RESUMEN

Objetivo: determinar y describir las características clínico epidemiológicas del recién nacido hijo de madre adolescente en el Hospital San Juan Bautista. Huaral 2014 – 2015.

Materiales y métodos: se realizó un estudio de tipo observacional, descriptivo, retrospectivo, de corte transversal, no experimental del recién nacido hijo de madre adolescente, la población al igual que la muestra estuvo conformada por 542 recién nacidos (RN) hijos de madres adolescentes. Se evaluaron las variables clínicas (edad gestacional por el método de Capurro, sexo, peso, talla y Apgar) y epidemiológicas (edad de la madre, procedencia, estado civil, nivel de instrucción, controles prenatales, tipo de parto y paridad).

Resultados: la incidencia de madres adolescentes en nuestro estudio fue 17.7%, el 96.9% eran adolescentes tardías, la edad promedio fue 17.6 años. El 82.1% eran nulíparas, 76.4% presentaron control prenatal (CPN) adecuado, y el 19.6% culminó la gestación por cesárea. Se encontró, que el 89.4% eran recién nacidos a término (RNAT), y 5.4% RN pre término, predominó el sexo masculino (55.9%) y la media de la talla fue 49.741cm., desviación estandar 2.23. El 67.2% de los neonatos presentaron adecuado peso al nacer, 22.1% peso insuficiente y 5.5% bajo peso al nacer. Se encontraron 8 RN con depresión severa (1.5%) y 25 RN con depresión moderada (4.6%). Con respecto al estado civil de las madres adolescentes, el 64.6% eran convivientes, 33.8% solteras, 0.2% de los casos era analfabeta, el 8.7% se encontraban cursando el nivel de instrucción primaria, el 80.6% secundaria y el 10.5% superior.

Conclusiones: los resultados obtenidos constatan que la tasa de incidencia de parto se incrementó en cada año, así como el CPN adecuado y el bajo peso al nacer. La mayoría perteneció al grupo etáreo de adolescentes tardías, convivientes, nivel de instrucción secundaria y la tasa de incidencia de cesárea disminuyó en cada año.

Palabras clave: *madre adolescente; edad gestacional; bajo peso al nacer; control prenatal; tipo de parto.*