

**“UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN”**

**FACULTAD DE MEDICINA HUMANA**



**TESIS**

**PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE MÉDICO CIRUJANO**

**“FACTORES DE RIESGO PARA PREECLAMPSIA EN GESTANTES  
ATENDIDAS EN EL HOSPITAL HUACHO HUAURA OYÓN Y  
SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD ENERO – DICIEMBRE DEL 2012”**

**AUTORAS:**

**Bach. ARTEAGA IBARRA, YOSELINY**

**Bach. HUAVIL FRANCIA, NORA INGRID**

**ASESOR: MAESTRO FREDY RUPERTO BERMEJO SÁNCHEZ**

**HUACHO-PERÚ**

**2013**

## RESUMEN

**Objetivo:** Determinar los factores de riesgo de las gestantes con Preeclampsia atendidas en el Hospital Huacho Huaura Oyón y Servicios Básicos de Salud Enero - Diciembre del 2012

**Métodos:** Estudio observacional analítico de casos controles en 95 gestantes con preeclampsia y 190 gestantes sanas que son los controles. Los datos fueron procesados y analizados utilizando el programa SPSS.21, considerándose un nivel de significancia  $p < 0.05$  y aplicando la prueba del chi cuadrado y T de Student. Se consideró como factor de riesgo a todo factor con  $OR > 1$  e IC95% que no contenía el valor neutro.

**Resultados:** Entre los factores de riesgo inherentes encontramos a: madre añosa (OR: 5.5 IC95%: 2.7-11.1), madre adolescente (OR: 4.8 IC95%: 2.7-8.4) y antecedentes de preeclampsia previa (OR: 4.1 IC95%: 1.6-10.8); la afección médica hallada fue la obesidad materna (OR: 3.2 IC95%: 1.7-5.9), entre los factores específicos del embarazo se encontró la infección urinaria (OR: 3.9 IC95%: 1.9-7.7), y entre otros factores hallamos al control prenatal inadecuado (OR: 2.8 IC95%: 1.5-5.1)

**Conclusión:** Se encontró como factores de riesgo para preeclampsia en nuestra localidad a: madre añosa, madre adolescente, obesidad materna, infección urinaria y inadecuado control prenatal.

**Palabras claves:** preeclampsia, factores de riesgo, gestantes.