

**UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN**

**FACULTAD DE EDUCACION**



**TESIS**

**CONSUMO DE ALCOHOL Y CONDUCTAS SEXUALES DE RIESGO EN  
LOS ESTUDIANTES DEL OCTAVO CICLO 2017 I DE LA  
ESPECIALIDAD DE CIENCIAS SOCIALES Y TURISMO DE LA  
FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ  
FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN – HUACHO.**

**PRESENTADO POR**

**Bach. MILAGROS MARIBEL ALCÁNTARA CHÁVEZ**

**Bach. CARLOS SANTILLÁN SEGURA**

**ASESOR**

**Dr. JORGE ALBERTO PALOMINO WAY**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO(a) EN EDUCACIÓN**

**Nivel SECUNDARIA Especialidad: CIENCIAS SOCIALES Y TURISMO**

**HUACHO-PERÚ**

**2019**

**TITULO**

**CONSUMO DE ALCOHOL Y CONDUCTAS SEXUALES DE RIESGO EN LOS  
ESTUDIANTES DEL OCTAVO CICLO 2017 I DE LA ESPECIALIDAD DE CIENCIAS  
SOCIALES Y TURISMO DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD  
NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN – HUACHO.**

---

**Dr. JORGE ALBERTO PALOMINO WAY**

**ASESOR**

M(o). ELISEO TORO DEXTRE

**PRESIDENTE**

M(o). CARLOS ALBERTO GUTIÉRREZ BRAVO

**SECRETARIO**

Dr. DANIEL LECCA ASCATE

**VOCAL**

## **DEDICATORIA**

Esta investigación la dedico a quienes me dieron la vida brindaron su apoyo incondicional para mi formación profesional a ellos y a mis queridos hijos que con mucho cariño y comprensión me dieron de su tiempo.

**MILAGROS MARIBEL**

A mi madre y a mi padre quienes son modelos de mi superación quienes me dieron su apoyo y aliento para culminar .

**CARLOS**

## **AGRADECIMIENTO**

Un agradecimiento al todo poderoso quien es guía en mi camino por llevarme por el sendero del bien, asimismo a mi hijo y padres por brindarme todo su apoyo moral y afectivo .

**MILAGROS MARIBEL**

Agradezco a mi familia por estar conmigo en todo momento de mi formación universitaria .

Al distinguido Dr. Jorge Alberto por la valiosa y generosa asesoría en todo momento

Agradezco a las autoridades de la facultad por permitirnos trabajar con los alumnos quienes aportaron en la realización de la presente averiguación.

**CARLOS**

# ÍNDICE GENERAL

TÍTULO: .....	¡Error! Marcador no definido.
DEDICATORIA.....	iii
AGRADECIMIENTO.....	iv
ÍNDICE GENERAL.....	v
ÍNDICE DE TABLAS .....	vii
ÍNDICE DE FIGURAS .....	viii
RESUMEN.....	ix
ABSTRACT .....	ix
I. INTRODUCCIÓN.....	11
1.1. Presentación general del trabajo .....	11
1.2. Justificación de la investigación.....	13
1.3. Alcances del estudio .....	14
1.4. Objetivos.....	15
II. REVISIÓN DE LITERATURA .....	16
2.1. Bases teóricas de la variable Relaciones Intrafamiliares.....	20
2.2. Términos conceptuales .....	28
III. MATERIALES Y MÉTODOS.....	28
3.1. Tipo de investigación.....	28
3.2. Diseño de investigación.....	28
3.3. Nivel .....	29
3.4. Enfoque.....	29
3.5. Población y muestra.....	29

3.6. Técnicas e instrumentos de investigación.....	29
3.7. Procesamiento y análisis de datos.....	31
IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN .....	33
4.1. Presentación de resultados.....	33
4.2. Discusión .....	33
CONCLUSIONES .....	84
RECOMENDACIONES .....	85
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
ANEXOS.....	92

## ÍNDICE DE TABLAS

<b>Tabla 1.</b> Frecuencia. consumo bebida de alcohol.....	1
<b>Tabla 2.</b> Cantidad de tragos de alcohol en consumo por dia .....	¡Error!
<b>Marcador no definido.</b>	
<b>Tabla 3.</b> frecuencia de cantidad de tragos .....	3
<b>Tabla 4.</b> frecuencia de incapacidad para beber alcohol.....	.4
<b>Tabla 5.</b> frecuencia sentimiento - culpa.....	5
<b>Tabla 6.</b> frecuencia culpa después de consumir alcohol.....	6
<b>Tabla 7</b> frecuencia de no recordar lo sucedido la noche anterior de seguir bebiendo.....	7
<b>Tabla 8</b> resultado como consecuencia de haber bebido .....	8
<b>Tabla 9</b> preocupacion de familiares o amigos por su consumo de alcohol .....	9
<b>Tabla 10</b> variable conductas sexuales -----.....	10
<b>Tabla 19</b> constatación de hipótesis.....	19
<b>Tabla 20</b> prueba de variables .....	20
<b>Tabla 21</b> contingencia consumo de alcohol sexo.....	21
<b>Tabla 22</b> chí cuadrada .....	22
<b>Tabla</b> contingencia estado civil .....	23

## ÍNDICE DE FIGURAS

<b>Figura 1.</b> Gráfico barras con resultados variable consumo de alcohol .....	1
<b>Figura 2.</b> resultados de la Cantidad de tragos de alcohol en consumo por día .....	2
<b>Figura 3.</b> Grafico de barras con los resultados de cantidad de tragos .....	3
<b>Figura 4.</b> incapacidad de beber alcohol.....	4
<b>Figura 5.</b> frecuencia de sentimiento de culpa.....	5
<b>Figura 6.</b> frecuencia de culpa después de consumir alcohol.....	6
<b>Figura 7</b> frecuencia de no recordar lo sucedido la noche anterior de seguir bebiendo.....	7
<b>Figura 8</b> resultado como consecuencia de haber bebido .....	8
<b>Figura 9</b> preocupacion de familiares o amigos por su consumo de alcohol .....	9
<b>Figura 10</b> variable conductas sexuales -----.....	10
<b>Figura 19</b> constatación de hipótesis.....	19
<b>Figura 20</b> prueba de variables .....	20
<b>Figura 21</b> contingencia consumo de alcohol sexo.....	21
<b>Figura 22</b> chi cuadrada .....	22
<b>Figura 23</b> de contingencia consumo de Alcohol estado civil .....	23...

## RESUMEN

Esta investigación está referida a la utilización de alcohol y conductas sexuales de riesgo en educando de VIII ciclo 2017. I de la CC. SS y Turismo de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión – Huacho.

Este estudio conforma parte de un estudio correlacional, de estudio transversal es de diseño no experimental, del universo de estudio estuvo comprendido por 30 alumnos, y el subconjunto corresponde a 30 de alumnos, de edades de 21 a 23 años.

Se evidenció que:

Existe vinculación entre el consumo de bebidas alcohólicas y las conductas sexuales de riesgo en los alumnos del VIII ciclo 2017 I, como consecuencia de la prueba de Chi cuadrado que muestra un valor de 18,185 y un valor  $p <= 0,05$ .

No se halló vínculo entre el consumo de bebidas alcohólicas y la condición que si actualmente cuentan con enamorado los alumnos del octavo ciclo 2017 I tal como se evidencia en los resultados estadísticos, ya que el valor  $p > 0,05$ .

**Palabras clave:** Consumo de alcohol, conductas sexuales, conductas sexuales de riesgo.

## ABSTRACT

This research is related to the use of alcohol and asexual behaviors finger risks among educating of-VIII cycles 2017. I finger side Edolo CC. SS ay Tourism finger side Faculty finger Education finger side National Universities José Faustino Sánchez Carrión - Huacho.

This study makes up part 1 finger, a study is hcorrelacionalles, finger cross-sectional study that finger design notes experimental a, of the universe finger study was misunderstood by 30 students, and the subset corresponds to and 30 students, aged 21 to 23 years.

Cheese was evidenced:

There is a link between the belly of the consumption of alcoholic beverages and the or asexual misconducts of the finger risks among the students of the VIII th cycle 2017 I, as a consequence of the Chi squared test, it shows one finger values 18.185 a and one values  $p \leq 0.05$ .

No link was found belly lello hconsumo0dedoh alcoholic beverages and the side that is conditioned is thus currently° they have fallen in love with the students of the eighth cycle 2017 I as evidenced in the statistical results, the revaluation has remained  $p > 0.05$ .

## **I. INTRODUCCIÓN**

### **1.1. presentación general del trabajo**

Esta investigación lleva por título “Consumo de alcohol y conductas sexuales de riesgo de los estudiantes del octavo ciclo 2017 I de la Especialidad de CC SS y Turismo de la F.E. U.N. J. F. S. C – Huacho”, tuvo como objeto de estudio alumnos ya mencionados

Es así como el Organismo internacional llamado OMS, sostiene que esos jóvenes forman el 20% de la población en el mundo, el (85%), hallándose en América Latina y en algunos países procedente como nuestro país en el cual se efectuó este estudio.

El objetivo de este estudio fue calcular la asociación del consumo de alcohol y las experiencias de conductas sexuales riesgosas en los estudiantes del octavo ciclo 2017-I de la E.C.S y Turismo de las Facultades de Educación de la U. N. J. F. S. C. – Huacho.

En ese sentido se ha determinado desarrollar la investigación en capítulos en los cuales se explica detalladamente todos los factores tomados en cuenta para poder hallar los resultados de las hipótesis sugeridas.

En el capítulo I, la presentación de la problemática en ese sentido también se hará de conocimiento a través de la justificación de la razón del desarrollo del estudio, de igual manera se detallara los alcances de la investigación haciendo de conocimiento la localización de la población y las teorías de distintos autores, se conocerá .

Lo concerniente al capítulo II, podrá desarrollarse de acuerdo al análisis de la bibliografía con sus respectivas bases teóricas de la variable relaciones intrafamiliares, y también la definición conceptual.

En el capítulo III, se detalla los materiales y –métodos así como también el tipo, el diseño, el nivel, el enfoque de estudio, por otro lado mostramos la población, muestra y metodologías en merito a la muestra, y además el proceso de ellos mismos.

Capítulo IV, se podrá apreciar los resultados y las recomendaciones presentándose las tablas y figuras estadísticas, y por último se efectuara una breve discusión, conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos.

## 1.2. Justificación

En el transcurso de nuestra trayectoria universitaria, hemos experimentado variadas dificultades ya sea de carácter personal y familiar en nuestro entorno, reflejándose mediante distintas situaciones como: rendimiento académico bajo, todo tipo de adicciones y los avances de una vida sexual disipadas.

La OMS(2011), referido en la utilización de bebidas alcohólicas sostiene: Es algo cotidiano en la vida universitaria todo ello se tiene conocimiento de la ingesta de esta droga social hace que se disminuya el de controlarse de igual forma y aumentan las conductas riesgosas. Todos tenemos conocimiento de que el consumo de bebidas alcohólicas puede dañar considerablemente nuestra salud De igual forma sabemos que las propagandas referidas a la oposición en exceso de las licores en los jóvenes . (p. 15)

DEVIDA ( 2009), En referencia sostiene que la edad promedio donde se empieza a ingerir licores es de 13 años. Confirma que cada 10 alumnos 4 (42.1%) probó alguna sustancia admitida, tanto alcohólica o cigarro.

En la U. N. J. F. S. C. de Huacho, específicamente en la F,de E, ubicamos Jóvenes provenientes de toda la provincia, región Limay a nivel nacional -quienes -proceden de familias de distintas condiciones

económicas quienes buscan brindarles mejores condiciones de vida para su futuro.

## **Formulación de las preguntas de investigación.**

### **Problema general**

¿Cómo se da el consumo de bebidas alcohólicas y las conductas sexuales de riesgo en los alumnos del octavo ciclo 2017 I de la especialidad de CC. SS y Turismo de la F. E. - UN J F S C – Huacho?

### **Problemas específicos**

¿Existe alguna relación entre el consumo de bebidas alcohólicas con el sexo de los alumnos del octavo ciclo 2017 I de la la especialidad de CC. SS y Turismo de la F. E. - UN J F S C – Huacho?

¿Existe alguna relación entre el consumo de bebidas alcohólicas con el estado civil de los alumnos del octavo ciclo 2017 I de la la especialidad de CC. SS y Turismo de la F.E - UN J F S C – Huacho?

¿Existe alguna relación entre el consumo de bebidas alcohólicas con la condición que si en la actualidad tienen enamorado los alumnos - la especialidad de CC. SS y Turismo de la Facultad de Educación de la UN J F S C – Huacho?

### **1.3. Alcances del estudio**

El estudio estuvo dirigida a atender la problemática que viven los alumnos - del octavo ciclo 2017- I de la especialidad de CC. SS y Turismo de la F. E-UN J F S C – Huacho

La intencion de esta investigación esta direccionada al efecto existente entre el consumo de alcoholes y conductas sexuales de riesgos de alumnos universitarios;

Igual forma también debería iniciar ente ncertado de las universidades del desarrollar programas con redes de soporte dirigidos a los jóvenes para prevenir conductas de riesgo .

### **1.4. Objetivos**

#### **1.4.1. Objetivo General**

Identificar como se da el consumo de bebidas alcohólicas y las conductas sexuales de riesgo en alumnos del octavo ciclo 2017 I de la especialidad de CC. SS y Turismo de la F. E.-UN J F S C – Huacho

### **1.4.2. Objetivos Específicos**

Hallar el vínculo entre el consumo de bebidas alcohólicas con el sexo de los alumnos del octavo ciclo 2017 I de la especialidad de CC. SS y Turismo de la F. E.- UN J F S C – Huacho

Determinar la relación entre el consumo de bebidas alcohólicas con el estado civil de los alumnos del octavo ciclo 2017 I de la especialidad de CC. SS y Turismo de la F E- UN J F S C – Huacho

Determinar la relación entre el consumo de bebidas alcohólicas con la condición que si actualmente tienen enamorado los alumnos del octavo ciclo 2017 I de la especialidad de CC. SS y Turismo de la F. E- UN J F S C – Huacho

El consumo de bebidas alcohólicas se relaciona con la condición que si actualmente tienen enamorado los estudiantes del octavo ciclo 2017 I de la Especialidad de Ciencias Sociales y Turismo de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión – Huacho

## **1.5. Hipótesis**

### **1,5,1 HIPÓTESIS GENERAL**

El consumo de bebidas alcohólicas se asocia con las conductas sexuales de riesgo en los estudiantes del octavo ciclo 2017 I de la Especialidad de CC SS y Turismo de la Fac. Educ. U. N. J.F. S. C – Huacho

### **1.5.2. Hipótesis específico**

El consumo de bebidas alcohólicas se relaciona con el sexo de los estudiantes del octavo ciclo 2017 I de la Especialidad de CC SS y Turismo de la Fac. Educ. U. N. J.F. S. C – Huacho

El consumo de bebidas alcohólicas se relaciona con el estado civil de los estudiantes del octavo ciclo 2017 I de la Especialidad CC SS y Turismo de la Fac. Educ. U. N. J.F. S. C – Huacho.

El consumo de bebidas alcohólicas se relaciona con la condición que si actualmente tienen enamorado los estudiantes del octavo ciclo 2017 I de la Especialidad de CC SS y Turismo de la Fac. Educ. U. N. J.F. S. C – Huacho

## II. REVISIÓN DE LITERATURA

### 2.1 Antecedentes de la investigación

#### Internacional

Ayala, L., Canabal, A., y Fuentes, S. (2016), en su investigación: *Consumo problemático alcohol, y todas las consecuencias y problemas que pueden ocasionar*. Objetivo identificar las peculiaridades referentes al consumo de licores de la muestra del estudio efectuado (p.16), Metodología del estudio es de corte cuantitativo, no experimental, descriptivo y transversal(p.26) Población : fueron 80 sujetos (p.26) Conclusiones: embarazos de gran nivel los cuales no los programaron, y todas las consecuencias existentes, por este motivo se efectúa el estudio aplicando las variables analizadas, evidenciando la vinculación de ellas y las consecuencias tan delicadas que ocasionan. (p.67)

Fernández, E., y otros. (2016), en su investigación: *Desarrollo y análisis de confiabilidad del cuestionario hallando los peligros sobre consumo de bebidas alcohólicas*. Su objetivo: analizar como advierten los daños referentes a la absorción de licores por parte de los alumnos de esta entidad..(p.15) Metodología : diseño no experimental transversal población se trabajó con 1377 alumnos, de dos entidades de estudios superiores (p.15) Conclusiones: se evidencio el reconocimiento de grandes niveles de

confiabilidad referente a los instrumentos establecidos. Se obtuvo resultados a través del análisis multivariado fortalecido consistentemente e internamente con las interrogantes aplicadas. Se demuestra el tipo bifactorial hallando, dimensiones que estimulan las conductas mostrando mas Alfa de Cronbach, es la que mayores diferencias muestra en cada uno de los conglomerados y tiene una mayor influencia en la clasificación de los estudiantes de acuerdo a los diferentes niveles de adecuación de la percepción de riesgo. (p.p.22-23)

## **Nacionales**

Trujillo, J. (2015), investigó acerca de las: *POSIBILIDADES REFERENTES AL CONSUMO DE LICORES Y CONDUCTAS SEXUALES PELIGROSAS EN ALUMNOS INICIALES* Pontificia Universidad Católica. objetivo: hallar el vínculo real entre las perspectivas referentes a las consecuencias de ello en alumnos pre universitarios. Población fue 78 alumnos en su mayoría hombres Los resultados señalan que las perspectivas de cada uno se vinculan favorablemente En cuanto a los hombres, son mayores y se halló una asociación con el empleo de preservativos y las relaciones sexuales inesperadas. Las posibilidades cognitivas y motoras positivas se vinculan, al contrario. (p. 5)

Rafael, M (2016), estudio denominado: *Relación entre funcionalidad familiar y conductas sexuales peligrosas en adolescentes - UNMSM Facultad de Medicina*. El objetivo fue Encontrar el vinculan entre la la variable del estudio. Metodología: no experimental descriptivo con estudio transversal (p.22). población: Adolescentes que asisten a consulta externa se calculó que 424 jóvenes ingresan cada dos semanas a las consultas (p.23) **Concluyendo** Los jóvenes que asisten a estas consultas se les reconoce por contar con edades desde los 16.9 años, en su mayoría fueron menores de edad contaban con problemas disfuncionales en su hogar (81,4%), ese grupo presenta casos menores. (p. 44)

## **2.2. Bases teóricas de la variable consumo de alcohol**

La presente investigacion pretende reconoce la relacion de Consumo de alcohol y conductas sexuales de riesgo en los alumnos del octavo ciclo 2017 I de la Especialidad de CC SS y Turismo de la F. E- U N J F S C – Huacho.

## **Consumo De Alcohol**

### **Definición:**

Según el comité de Expertos OMS es el disturbio conductual crónico presentado por reiteradas consumo de licores, en grandes cantidades referentes a lo reglamentado y que terminan dañando su organismo ademas de atentar con su ecomnomia

Pons, J. y Berjano, E. (1999), nos dicen la ingesta de alcohol “es el uso de una sustancia en un momento dado, trayendo como resultado se determinados efectos; asimismo, el alcohol lo utiliza el alcohólico, el beodo frecuente, el beodo fortuito, así como el que lo hace por vez primera ” (p.131).

Arkowitz, y otros (1978), certifican que: Para los universitarios es significativo la interacción con los camaradas, y también con el sexo contrario; la aprobación motivaría a los educandos a colectivizar, no obstante la interrelación con personas distintas y los contextos de reivindicación social conseguirán estimulan emociones de angustia social debido a que el 37% de algunos estudiantes muestran nerviosismo o angustia en el momento en que interrelacionan con personas del sexo contrario. (p. 47)

Burke y Stephens (1999),nos dicen : La disposición de consumo de alcohol median conocimientos de las secuelas de la ingesta en aspectos

tangibles; para muestra, la idea de que el alcohol reduce la angustia y es un mediador social; y la idea de que no existen otras tácticas para reducir la angustia. La gran parte de universitarios se caracteriza por afirmar su independencia, el asumir roles de adultos y presentar impresiones de inmunidad que pueden estimular a la ingesta de alcohol. En otros casos en el que los individuos presentan grados altos de inseguridad y ansiedad relacionados a contextos de su vida, pueden pensar que las drogas y el alcohol, preparan contextos para determinados comportamientos sociales o relaciones coitales. Consideran que la eficacia y complacencia en contextos de reuniones de las conductas sexuales y sociales, no podrían darse sin el consumo de alcohol. En el aspecto sexual, excluye que en el momento que aumenta el consumo de alcohol, comienza la deterioro del cumplimiento sexual no por situaciones psicosociales sino debido al cambio orgánico que acontece, lo cual desmiente la hipótesis en la que se sostiene la ingesta de sustancias psicoactivas. (p. 515)

Gual, A., Anderson, P., y Colon, J. (2008), “la ingesta de libaciones alcohólicas se refiere al consumo de alcohol, en medidas de alcohol usados o de bebidas patrón. Por ejemplo en Europa, una bebida patrón posee 10 gramos de alcohol absoluto” (p. 139).

Peugh y Belenko (2001), en su investigación hallaron que la: Utilización de elementos como alcohol y nicotina; y otras sustancias ilegales, tienen secuelas en el ambiente sexual, por la perturbación o variabilidad en los

neurotransmisores, esencialmente dopamina, norepinefrina y serotonina, que dañan la actividad de hormonas relacionadas con la estimulación sexual y los elementos funcionales de los órganos genitales. (p. 225)

Gual, A., Anderson, P., y Colon, J. (2008), afirmaron que en el plano científico: Las investigaciones de grandes cantidades de ingesta de licores esta expresado en gramos de alcohol absoluto, para las igualaciones entre un estado y otro. La terminología licor patrón es utilizado para abreviar la comprobación de ingesta de alcohol. Muy a pesar de ello alcanza ser equívoco, su exactitud se usa como hábito para deducir la ingesta de alcohol, por muestra, de zonas de emergencia y catástrofes, en lugares de urgencias primarias y en personas hospitalizados. (p. 139)

La OMS. (2001), planteó esta estimación estándar para los licores: Para 3301m de cerveza al 5%, 140 ml de vino al 12%, 90 ml de vinos reforzados como el jerez al 18%, 70 ml de licor o aperitivo al 25%, 40 ml de bebidas espirituosas (alcohol destilado de: remolacha, ), al 40%. (p. 10)

Londoño, García, Valencia y Vinaccia, (2005), señalaron que: Los universitarios son altamente vulnerables para la ingesta de alcohol por la facilidad de comprar las bebidas alcohólicas y el aumento de contextos de consumo, al encontrarse en el medio universitario. Las políticas estatales y la

colectividad universitaria deben de iniciar eventos de previsión de su población. La programación debe consignar este contexto, para promover la intervención en la ingesta así como impulsar actividades y propósitos para los distintos grupos de interés. (p. 262)

## **CONDUCTAS SEXUALES DE RIESGO**

Para las Organizaciones Mundiales de la Salud (OMS, 2016), la salud sexual peso: Uno períodos dedo comforts corporales, intelectuales ya colectivos ente correspondencias como las sexualidades. Advierte un perspectiva positiva y considerado de la sexualidad y de las relaciones coitales, asimismo la probabilidad de poseer experticias sexuales agradables y seguras, independientes de toda imposición, segregación y exceso. (p. 24)

En referencia a la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016), la sexualidad: Forma parte de la vida humana y está formada de cuatro características que interactúan entre sí y con otros sistemas, de forma específica en los niveles biológico, psicológico y social. Estas características son: **El erotismo** (concebir goce a través de la réplica sexual, expresada a través del deseo, la excitación y el orgasmo sexual); **La vinculación afectiva** (despliega e instaurar correlaciones interpersonales representativas); **La reproductividad** (relacionado a poseer hijos y educarlos, circunscribe sentimientos maternos y paternos, condiciones de progreso y formación de

otros seres); y **La característica del sexo desarrollado** (nivel de posesión a lo femenino o varonil, cimentación de la identidad sexual que contiene las representaciones mentales y comportamentales de ser hombre o dama. (p. 26)

Ceballos, O Rodríguez DA nos dicen : que el uso de drogas constituye un facilitador de las conductas sexuales de riesgo en la etapa de la juventud , sin embargo los que la consumen son más propensos a realizar estas prácticas

### **DEFINICIONES:**

García, E., y otros (2012), afirman que las conductas sexuales riesgosas son: “prácticas que acrecientan la inseguridad de obtener un padecimiento de transferencia genital” (p. 85).

### **Comportamientos Sexuales de Alto Riesgo:**

García, E., y otros., (2012), consideran que los comportamientos sexuales de alto riesgo son:

- Poseer múltiples parejas sexuales.
- Haber tendido historia anterior de enfermedad transmitida por vía sexual.
- Haber tenido una pareja con historia anterior de enfermedad sexual.
- Sostener una relación con pareja que tiene historia desconocida.
- Uso de alcohol o drogas en contextos de intercambio sexual.
- Poseer un (a) compañera (o) que usa droga vía intravenosa.
- Sostener relación con parejas bisexuales u homosexuales.

- Sostener relaciones anales.
- Tener coito sin uso de profilácticos con desconocidos. (pp. 85-86)

Weinstock, Breman Cates (2004), coincidieron en que: “la función sexual de adolescentes alcanza a 25% de la función sexual total; no obstante, del total de informes por padecimientos de contagio sexual, 50% pertenece a este conjunto” (p. 7).

Gomes M, y otros (2014), señalaron que la de conducta de riesgo, también se define como: Ocurrencias de la función sexual como consecuencia del alcohol o las drogas, porque el dominio de sí mismo merma a raíz del uso de estas sustancias, en relación a la utilización sincrónica de tabaco, alcohol, y drogas, hay una investigación que deduce que un factor trascendente en la conducta de riesgo es el uso de drogas; otra investigación en universitarios afirmó que el uso de estupefacientes corresponde a contextos de problemas de familia, pareja, aprietos financieros y el tener coito de manera fortuita. (p. 45)

Sánchez J., Sabuco A., y Amorós M., (2013), afirman que: La experiencia sexual relacionada al uso de estupefacientes aumenta el peligro de adquirir contagios por transferencia sexual y preñez no ansiada, un estudio en jóvenes hispanos indicó que el 52 % del total de encuestados expresó haber sostenido relaciones coitales como consecuencia del uso de alcohol, marihuana, cocaína, y drogas sintéticas. El alcohol es la más utilizada con el coito (47,6 %), la marihuana

un 23,4 %, la cocaína un 1,5 % y las drogas sintéticas el 1,1 %. La previsión posee un resultado efectivo en el declive de dificultades sexuales en la juventud y el comienzo del período de la adultez. (p. 25)

De lo antes señalado se puede afirmar que hay una gran seguridad de que los individuos con quienes se tiene coito, poseen una carencia de razón debido a que estas experiencias sexuales se efectúan después de haber consumido alcohol o drogas, y que logran liberar a las personas del uso de la conciencia y colocarlas en una situación de peligro, debido a que se dejan llevar por las circunstancias sin recapacitar en los efectos.

Estas acciones pueden producir perjuicios, principalmente porque se pueden contraer infecciones de transmisión sexual, o desarrollar una gestación no esperada y como consecuencia de ello abortos en contextos de peligro para la salud.

### **2.3. Términos conceptuales**

#### **Familia**

##### **CONSUMO DE ALCOHOL:**

Pons, J. y Borjano, E. (1999), afirman que: “Es la ingesta del alcohol efectuado por el alcohólico, como el bebedor habitual, así también el bebedor ocasional, así mismo el que lo hace por vez primera. Posteriormente trae consigo secuelas para la salud” (p. 131)

**CONDUCTAS SEXUALES DE RIESGO:** García, E., y otros (2012), considerando que las conductas sexuales de riesgos son: “prácticas que aumentan el riesgo de adquirir una enfermedad de transmisión sexual” (p. 79).

El ministerio de educación del Perú nos brinda un portal web que resulta muy beneficioso para los maestros, colegiales y padres de diversos establecimientos educativos, ayudándolos al sumario del saber, en casa y escuela para que alcancen tener un grato ambiente familiar.

### **III. MATERIALES Y MÉTODOS**

#### **3.1. Tipo de investigación**

Esta investigación pertenece al descriptivo-cuantitativo, correlacional.

Es descriptivo porque describe y mide las variables del estudio:

Así mismo se puede decir que es correlacional ya que da a saber las relaciones que hay entre consumo de alcohol y conductas sexuales de riesgo.

### 3.2. Diseño de investigación

No experimental, transversal, descriptivo.


### 3.3. Nivel

Descriptivo.

### 3.4. Enfoque

El diseño que se ha empleado pertenece al No Experimental. El diseño que se considera conveniente para la investigación es Transversal, debido a que los datos se recolectan en un tiempo único, examinando las variables del estudio a fin de considerar como inciden y que interrelación presentan.

El diseño del presente trabajo es:



### 3.5. Población y muestra

El universo lo forman 30 estudiantes del octavo ciclo 2017 I tal y como se ha establecido en el desarrollo de este estudio, la muestra que se ha

considerado comprende a la misma cantidad de la población de estudiantes, cuyas edades se encuentran comprendidas de los 21 a 23 años.

### CUADRO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS 2017 I

AÑO	SECCIÓN	VARONES	MUJERES	Nº DE ESTUDIANTES
8º	A	20	10	30
<b>TOTAL</b>		<b>20</b>	<b>10</b>	<b>30</b>

*Fuente: Dirección de Escuela.*

Niveles	Cantidades	%
<u>Población:</u> Estudiantes del octavo ciclo		
2017 I en referencia a lo considerado durante el desarrollo respectivo	30	100%
<u>Muestra:</u> Totalidad de estudiantes del octavo ciclo 2017 I.		
	30	100%

### **3.6. Técnicas e instrumentos de investigación**

#### **TÉCNICAS A EMPLEAR**

Se recurrirán a las siguientes:

- Observación indirecta.
- Encuesta.

#### **DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS**

Guías para observar: Se aplicó la revisión y observación del comportamiento de las personas, y cómo actúan en su medio natural. La finalidad es obtener determinada información necesaria para la investigación

### **3.7. Procesamiento y análisis de datos**

#### **PROCESAMIENTO MANUAL**

En la tesis desarrollada se utilizó dos cuestionarios de interrogantes tipo encuestas, como se ve en el modelo anexo.

## **PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO**

Inmediatamente después de aplicar las escalas a los universitarios del octavo ciclo 2017 I se tabuló con el programa Microsoft Excel, y luego se clasificó los ítems, y finalmente se tabularon las resultas.

## **TRATAMIENTO ESTADÍSTICO (SE APLICARÁ EL PROCESADOR STATISTICAL PACKAGE OF SOCIAL SCIENCES – SPSS)**

- Proceso de datos.
- Análisis e Interpretación de Datos.
- Se someterá a Prueba:
  - La Hipótesis Central
  - La Hipótesis específicas
  - Cuadros de doble ingreso
- Coeficiente de Pearson

#### IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

##### 4.1. Presentación de resultado


Variable: Consumo de Alcohol

TABLA 1

¿Con qué frecuencia consume una bebida alcohólica

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Nunca	1	3,3	3,3	3,3
	1 o menos veces al mes	13	43,3	43,3	46,7
	De 2 a 4 veces al mes	16	53,3	53,3	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

Para mejor estimación y semejanza se muestra la siguiente figura:




De la fig. 1, un 53,3% de alumnos consumen con frecuencia una bebida alcohólica 2 a 4 veces al mes, un 43,3% la consume de 1 o menos veces al mes y un 3,3% nunca lo hacen.

**TABLA 2**

**¿Cuántos TRAGOS de alcohol sueles tomar en un día de consumo normal?**

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	1 a 2	4	13,3	13,3
	3 o 4	6	20,0	33,3
	5 o 6	17	56,7	90,0
	7,8 o 9	3	10,0	100,0
	Total	30	100,0	

Para mejor estimación y semejanza se muestra la siguiente figura:




De la fig. 2, un 56,7% de los estudiantes del octavo ciclo 2017-I de la especialidad de Ciencias Sociales y Turismo de la Facultad de Educación, UNJFSC– Huacho se toman de 5 o 6 tragos en un día de consumo normal, un 20,0% de 3 o 4 tragos, un 13,3% de 1 a 2 tragos y un 10,0% de 7 a 9 tragos.

**TABLA 3**

**¿Con qué frecuencia toma 5 o más TRAGOS en un solo día?**

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Nunca	12	40,0	40,0	40,0
	Menos de una vez al mes	10	33,3	33,3	73,3
	Mensualmente	6	20,0	20,0	93,3
	Semanalmente	2	6,7	6,7	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

Para mejor estimación y semejanza se muestra la siguiente figura:




De la fig. 3, un 40,0% de los estudiantes del octavo ciclo 2017-I de la especialidad de Ciencias Sociales y Turismo de la Facultad de Educación, UNJFSC– Huacho nunca se toman de 5 o más tragos en un solo día, un 33,3% menos de una vez al mes, un 20,0% lo hace mensualmente y un 6,7% lo hace semanalmente.

**TABLA 4**

**En el curso del último año, ¿Con qué frecuencia ha sido incapaz de parar de beber una vez que había empezado?**

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Nunca	9	30,0	30,0	30,0
	Menos de una vez al mes	11	36,7	36,7	66,7
	Mensualmente	8	26,7	26,7	93,3
	Semanalmente	2	6,7	6,7	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

Para mejor estimación y semejanza se muestra la siguiente figura:




De la fig. 4, un 36,7% de los estudiantes del octavo ciclo 2017-I, UNJFSC–Huacho ha sido incapaz de parar de beber un vez que había empezado al menos de una vez al mes, un 30,0% nunca lo hace, otro 26,7% lo hace mensualmente y un 6,7% lo realiza semanalmente.

**TABLA 5**

**En el curso del último año, ¿Con qué frecuencia ha tenido remordimientos o sentimientos de culpa después de haber bebido?**

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Nunca	14	46,7	46,7	46,7
	Menos de una vez al mes	9	30,0	30,0	76,7
	Mensualmente	5	16,7	16,7	93,3
	Semanalmente	2	6,7	6,7	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

Para mejor estimación y semejanza se muestra la siguiente figura:



De la fig. 5, un 40,0% de alumnado del octavo ciclo 2017-I de la especialidad de Ciencias Sociales y Turismo de la Facultad de Educación, UNJFSC– Huacho menos de una vez al mes necesita beber en ayunas para recobrase después de haber tomado mucho la jornada anterior, un 36,7% jamás lo hace, un 20,0% lo hace mensualmente y un 3,3% lo hace semanalmente.


**TABLA 6**

**En el curso del último año, ¿Con qué frecuencia ha tenido remordimientos o sentimientos de culpa después de haber bebido?**

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Nunca	14	46,7	46,7
	Menos de una vez al mes	9	30,0	76,7
	Mensualmente	5	16,7	93,3
	Semanalmente	2	6,7	100,0
	Total	30	100,0	

**Fuente:** Cuestionario aplicado a estudiantes del octavo ciclo 2017-I, UNJFSC– Huacho.

Para mejor estimación y semejanza se muestra la siguiente figura:




De la fig. 6, un 46,7% de los estudiantes del octavo ciclo 2017-I afirman que en el último año ninguna vez ha tenido arrepentimientos o estremecimiento de yerro después de haber bebido, un 30,0% carencia de una vez al mes, un 16,7% mensualmente y un 6,7% semanalmente.

**TABLA 7**

**En el curso del último año, ¿Con qué frecuencia no ha podido recordar lo que sucedió la noche anterior porque había estado bebiendo?**

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Nunca	15	50,0	50,0	50,0
	Menos de una vez al mes	10	33,3	33,3	83,3
	Mensualmente	5	16,7	16,7	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

Para mejor estimación y semejanza se muestra la siguiente figura:



De la fig. 7, un 50,0% de alumnos del octavo ciclo 2017-I de la especialidad de Ciencias Sociales y Turismo de la Facultad de Educación, UNJFSC– Huacho sostiene que nunca en el último año ha alcanzado acordarse lo que aconteció la noche anterior puesto que había estado tomando, un 33,3% lo han hecho al menos de un vez al mes y un 16,7% lo realizan mensualmente y un 5,0% lo hacen semanalmente.


**TABLA 8**

**¿Usted o alguna otra persona ha resultado herido porque usted había bebido?**

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	No	25	83,3	83,3	83,3
	Si pero no el curso del último año	5	16,7	16,7	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

**Fuente:** Cuestionario aplicado a estudiantes del octavo ciclo 2017-I

Para mejor estimación y semejanza se muestra la siguiente figura:




De la fig. 8, un 83,3% de los estudiantes del octavo ciclo 2017-I de la especialidad de Ciencias Sociales y Turismo de la Facultad de Educación, UNJFSC– Huacho, sustentan que nunca ha salido el u otro individuo dañado porque se había embriagado y un 16,7% afirma que si pero no en el último año.

**TABLA 9**

**¿Algún familiar, amigo, médico o profesional de la salud ha mostrado preocupación por su consumo de bebidas alcohólicas o le han sugerido que deje de beber?**

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos No	11	36,7	36,7	36,7
Si pero no el curso del ultimo año	17	56,7	56,7	93,3
Si, el último año	2	6,7	6,7	100,0
Total	30	100,0	100,0	

Para mejor estimación y semejanza se muestra la siguiente figura:




De la fig. 9, un 56,7% de los estudiantes del octavo ciclo 2017-I de la especialidad de Ciencias Sociales y Turismo de la Facultad de Educación, UNJFSC– Huacho afirman que sí, pero no en el curso del actual año algún conocido, compañero o experto en salud ha mostrado intranquilidad por el uso de bebidas alcohólica, un 36,7% no se ha preocupado y un 6,7% si el último año.

**Variable: Conductas sexuales**

**TABLA 10**

		<b>Sexo</b>			
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Masculino	16	53,3	53,3	53,3
	Femenino	14	46,7	46,7	100,0
Total		30	100,0	100,0	

Para mejor estimación y semejanza se muestra la siguiente figura:




De la fig. 10, un 53,3% de los estudiantes del octavo ciclo 2017-I son hombres y 46,7% son mujeres.

**TABLA 11**

<b>Estado civil</b>					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Casado	1	3,3	3,3	3,3
	Unión estable	5	16,7	16,7	20,0
	Soltero	24	80,0	80,0	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

Para mejor estimación y semejanza se muestra la siguiente figura




De la fig. 11, un 80,0% de los estudiantes del octavo ciclo 2017-I de la especialidad de Ciencias Sociales y Turismo de la Facultad de Educación, UNJFSC– Huacho son solteros, el 16,7% son de unión estable y un 3,3% son casados.

**TABLA 12**

**¿Actualmente tienes enamorado(a)**

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Si	21	70,0	70,0	70,0
	No	9	30,0	30,0	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

Para mejor estimación y semejanza se muestra la siguiente figura:




De la fig. 12, el 70,0% de los estudiantes del octavo ciclo 2017-I de la especialidad de Ciencias Sociales y Turismo de la Facultad de Educación, UNJFSC– Huacho afirman que si poseen enamorado(a) actualmente y un 30,0% no lo tienen.

**TABLA 13**

**vez has tenido relaciones coitales (relaciones sexuales):**

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Si	26	86,7	86,7	86,7
	No	4	13,3	13,3	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

Para mejor estimación y semejanza se muestra la siguiente figura:




De la fig. 13, un 86,7% de los estudiantes del octavo ciclo 2017-I, aseveran que si alguna vez ha tenido relaciones coitales o sexuales y un 13,3% aún no lo ha tenido.

**TABLA 14**

**qué edad tuviste tu primera relación sexual?**

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	15	2	6,7	6,7	6,7
	18	5	16,7	16,7	23,3
	20	16	53,3	53,3	76,7
	22	4	13,3	13,3	90,0
	24	2	6,7	6,7	96,7
	26	1	3,3	3,3	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

Para mejor estimación y semejanza se muestra la siguiente figura:



De la fig. 14, el 53,3% de estudiantes del octavo ciclo 2017-I, UNJFSC–Huacho, aseveran que tuvieron su primera relación a los 20 años, un 16,7% lo tuvieron a los 18 años, un 13,3% a los 22 años y un 6,7% lo tuvo a los 15 años.

**TABLA 15**

**¿En los 6 últimos meses con qué frecuencia tuviste relaciones sexuales?:**

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Ninguna vez	2	6,7	6,7	6,7
	De 1 a 4 veces	24	80,0	80,0	86,7
	De 5 a 8 veces	3	10,0	10,0	96,7
	De 9 a 16 veces	1	3,3	3,3	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

Para mejor estimación y semejanza se muestra la siguiente figura:




Figura 15


De la fig. 15, el 80,0% de estudiantes del octavo ciclo 2017-I, señalan que en los últimos 6 meses tuvieron relaciones sexuales de 1 a 4 veces, un 10,0% lo tuvieron de 5 a 8 veces y un 6,7% no lo tuvieron ninguna vez.

**TABLA 16**

**¿Cuántas parejas sexuales has tenido en los 6 últimos meses?**

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	1 - 3	28	93,3	93,3	93,3
	4 - 6	2	6,7	6,7	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

Para mejor estimación y semejanza se muestra la siguiente figura::




De la fig. 16, el 93,3% de estudiantes del octavo ciclo 2017-I, sostienen que en los 6 últimos meses han tenido de 1 a 3 parejas sexuales y un 6,7% de 4 a 6 parejas.

**TABLA 17**

**En los seis últimos meses ¿Has tenido relaciones sexuales con alguien que hayas conocido en el momento? (Por ejemplo en un fiesta o reunión)**

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Si	6	20,0	20,0	20,0
	No	24	80,0	80,0	100,0
Total		30	100,0	100,0	

Para mejor estimación y semejanza se muestra la siguiente figura:




De la fig. 17, el 80,0% de los estudiantes del octavo ciclo 2017-I, sostienen que en los seis últimos meses no han gozado de relaciones coitales con alguien que hayan conocido en el momento y un 20,0% si lo han tenido.

**TABLA 18**

**¿Cuando tienes relaciones sexuales usas preservativo (condón)?:**

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válidos	Nunca	4	13,3	13,3	13,3
	Ocasionalmente	11	36,7	36,7	50,0
	Siempre	15	50,0	50,0	100,0
	Total	30	100,0	100,0	

Para mejor estimación y semejanza se muestra la siguiente figura:



De la fig. 18, el 50,0% de los estudiantes del octavo ciclo 2017-I sostienen que siempre usan preservativo cuando han tenido relaciones sexuales, un 36,7% lo usan ocasionalmente y un 13,3% nunca lo han usado.

## **4.2 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS**

### **Hipótesis General**

Hipótesis Alternativa  $H_a$ : El consumo de bebidas alcohólicas se asocia con las conductas sexuales de riesgo en los estudiantes del octavo ciclo 2017 I de la Especialidad de Ciencias Sociales y Turismo de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión – Huacho.

Hipótesis nula  $H_0$ : El consumo de bebidas alcohólicas no se asocia con las conductas sexuales de riesgo en los estudiantes del octavo ciclo 2017 I de la Especialidad de Ciencias Sociales y Turismo de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión – Huacho.

**Tabla 19**

		Comportamiento sexual			Total
		Bajo	Medio	Alto	
	Bajo riesgo	0	1	10	11
		0,0%	9,1%	90,9%	100,0%
Consumo	de Problema	5	0	0	5
alcohol	dependencia	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
	Riesgo	10	4	0	14
		71,4%	28,6%	0,0%	100,0%
Total		15	5	10	30
		50,0%	16,7%	33,3%	100,0%

**Fuente:** *Elaboración propia*

Como se observa en la tabla 19:

- De los 11 encuestados que presentan un bajo riesgo en el consumo de alcohol, el 90,9% tiene un nivel alto de comportamiento sexual y un 9,1% un nivel medio.
- De 5 encuestados que presentan un problema o dependencia en la ingesta de alcohol, el 100,0% tiene un nivel bajo de comportamiento sexual.
- De 14 encuestados que muestran un riesgo en la ingesta de alcohol, el 71,4% tiene un nivel bajo de comportamiento sexual y un 28,6% un nivel medio.


**TABLA 20**

**Pruebas de chi-cuadrado**

	Valor	gl	Sig. asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	28,961 <sup>a</sup>	4	,000
Razón de verosimilitudes	37,231	4	,000
N de casos válidos	30		

a. 7 casillas (77,8%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,83.

Para efectos de mejor apreciación y comparación se presenta la siguiente figura:



**Figura 19.** Consumo de alcohol y comportamiento sexual

### **Hipótesis específica 1**

Hipótesis Alternativa  $H_a$ : El consumo de bebidas alcohólicas se relaciona con el sexo de los estudiantes del octavo ciclo 2017 I de la Especialidad de Ciencias Sociales y Turismo de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión – Huacho.

Hipótesis nula  $H_0$ : El consumo de bebidas alcohólicas no se relaciona con el sexo de los estudiantes del octavo ciclo 2017 I de la Especialidad de Ciencias Sociales y Turismo de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión – Huacho.

**Tabla 21**

**Tabla de contingencia Consumo de alcohol \* Sexo**

		Sexo		Total
		Masculino	Femenino	
	Bajo riesgo	6	5	11
		54,5%	45,5%	100,0%
Consumo de alcohol	Problema o dependencia	2	3	5
		40,0%	60,0%	100,0%
	Riesgo	8	6	14
		57,1%	42,9%	100,0%
Total		16	14	30
		53,3%	46,7%	100,0%

**Fuente:** *Elaboración propia*

Como se observa en la tabla 21:

- 11 encuestados presentan un bajo riesgo en el consumo de alcohol, el 54,5% es de sexo masculino y un 45,5% de sexo femenino.
- De 5 encuestados que presentan un problema o dependencia en el consumo de alcohol, un 60,0% son de sexo femenino y un 40,0% del sexo masculino.
- De 14 encuestados que muestran un riesgo en la ingesta de alcohol, el 57,1% son de sexo masculino y un 42,9% de sexo femenino.

**Tabla 22**


**Pruebas de chi-cuadrado**

	Valor	gl	Sig. asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	,445 <sup>a</sup>	2	,000
Razón de verosimilitudes	,446	2	,000
N de casos válidos	30		

a. 2 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 2,33.

Según la tabla 22, el estadístico Chi- cuadrado restituye un valor de significancia  $p=0.800 > 0.05$  la hipótesis nula se acepta y se rechaza la hipótesis alterna. Por lo que se deduce que existe relación entre el consumo de bebidas alcohólicas y el sexo de los estudiantes del octavo ciclo 2017 I de la Especialidad de Ciencias Sociales y Turismo de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión – Huacho.

Para efectos de mejor apreciación y comparación se presenta la siguiente figura:



**Figura 20.** Consumo de alcohol y sexo del encuestado

**Hipótesis específica 2**

Hipótesis Alternativa  $H_a$ : El consumo de bebidas alcohólicas se relaciona con el estado civil de los estudiantes del octavo ciclo 2017 I de la Especialidad de Ciencias Sociales y Turismo de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión – Huacho.

Hipótesis nula  $H_0$ : El consumo de bebidas alcohólicas no se relaciona con el estado civil de los estudiantes del octavo ciclo 2017 I de la Especialidad de Ciencias Sociales y Turismo de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión – Huacho.

**Tabla 23**

**Tabla de contingencia Consumo de alcohol \* Estado civil**

		Estado civil			Total
		Casado	Unión estable	Soltero	
	Bajo riesgo	0	3	8	11
		0,0%	27,3%	72,7%	100,0%
Consumo de alcohol	Problema o dependencia	0	0	5	5
		0,0%	0,0%	100,0%	100,0%
	Riesgo	1	2	11	14
		7,1%	14,3%	78,6%	100,0%
Total		1	5	24	30
		3,3%	16,7%	80,0%	100,0%

**Fuente:** *Elaboración propia*

Como se observa en la tabla 23:

- 11 encuestados presentan un bajo riesgo en el consumo de alcohol, el 72,7% son solteros, y un 27,3% son de unión estable.
- De 5 encuestados que presentan un problema o dependencia en la ingesta de alcohol, el 100,0% son solteros.
- De 14 encuestados que muestran un riesgo en la ingesta de alcohol, el 78,6% son soltero, un 14,3% son de unión estable y un 7,1% son casados.

**Tabla 24**


**Pruebas de chi-cuadrado**

	Valor	gl	Sig. asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	3,093 <sup>a</sup>	4	,000
Razón de verosimilitudes	4,173	4	,001
N de casos válidos	30		

a. 7 casillas (77,8%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,17.

Como se observa en la tabla 24, el estadígrafo Chi- cuadrado devuelve un valor de significancia  $p=0.542 > 0.05$  la hipótesis nula es aceptada y es rechazada la hipótesis alterna. Por lo que se deduce que hay una relación entre el consumo de bebidas alcohólicas y el estado civil de los estudiantes del octavo ciclo 2017 I de la Especialidad de Ciencias Sociales y Turismo de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión – Huacho.

Para efectos de mejor apreciación y comparación se presenta la siguiente figura:



**Figura 21.** Consumo de alcohol y estado civil

### Hipótesis específica 3

Hipótesis Alternativa Ha: El consumo de bebidas alcohólicas se relaciona con la condición que si actualmente tienen enamorado los estudiantes del octavo ciclo 2017 I de la Especialidad de Ciencias Sociales y Turismo de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión – Huacho.

Hipótesis nula  $H_0$ : El consumo de bebidas alcohólicas no se relaciona con la condición que si actualmente tienen enamorado los estudiantes del octavo ciclo 2017 I de la Especialidad de Ciencias Sociales y Turismo de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión – Huacho.

**Tabla 25**

**Tabla de contingencia Consumo de alcohol \* ¿Actualmente tienes enamorado(a)**

		¿Actualmente tienes enamorado(a)		Total
		Si	No	
Consumo de alcohol	de Bajo riesgo	9	2	11
		81,8%	18,2%	100,0%

	Problema o dependencia	3	2	5
		60,0%	40,0%	100,0%
	Riesgo	9	5	14
		64,3%	35,7%	100,0%
Total		21	9	30
		70,0%	30,0%	100,0%

**Fuente:** *Elaboración propia*

Como se observa en la tabla 25:

- 11 encuestados presentan un bajo riesgo en el consumo de alcohol, el 81,2% si tienen enamorado y un 18,2% no lo tienen.
- De 5 encuestados que presentan un problema o dependencia en el consumo de alcohol, el 60,0% si tienen enamorado y un 40,0% no lo tienen.
- 14 encuestados presentan un riesgo en la ingesta de alcohol, el 64,3% si tienen enamorado y un 35,7% no lo tienen.

**Tabla 26**


**Pruebas de chi-cuadrado**

	Valor	gl	Sig. asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	1,187 <sup>a</sup>	2	,552
Razón de verosimilitudes	1,241	2	,538
N de casos válidos	30		

a. 4 casillas (66,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,50.

En la tabla 26 el estadígrafo Chi- cuadrado restituye un valor de significancia  $p=0.552 > 0.05$  la hipótesis nula es aceptada y es rechazada la hipótesis alterna. Por lo que se deduce que no hay relación entre el consumo de bebidas alcohólicas y la condición que si actualmente tienen enamorado los estudiantes del octavo ciclo 2017 I de la Especialidad de Ciencias Sociales y Turismo de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión – Huacho.

Para efectos de mejor apreciación y comparación se presenta la siguiente figura:



**Figura 22.** Consumo de alcohol y si actualmente tienes enamorado

## 4.2. Discusión

En diversas investigaciones acerca de consumo de alcohol y conductas sexuales de riesgo en estudiantes universitarios, como es el caso de:

Ayala, L., Canabal, A., y Fuentes, S. (2016), en su investigación: Consumo problemático alcohol, conductas de riesgo sexual y búsqueda de sensaciones en estudiantes de primer semestre de una universidad privada de la ciudad de Cartagena. Llegaron a las siguientes conclusiones: De las resultas obtenidas se encontró que el 43% del total bebe alcohol, el 21% de quienes beben alcohol presentan dificultades vinculadas con el alcohol entretanto el 16% posee dependencia al alcohol, asimismo se encontró que no existen diferencias importante en cuanto al uso de alcohol entre varones y mujeres. El 63% del total de individuos investigados han sostenido coito en cierto período de su existencia. El 80% del total de las personas que han iniciado su vida sexual han tenido su primera relación sexual antes de cumplir los 18 años; respecto al número de parejas sexuales se halló que el 38% del total de encuestados que ha mantenido coito con 2 a 3 parejas, de la misma forma se halló que un 10% han mantenido coito con 4 a 5 parejas y un 22% han mantenido coito con 6 o más parejas; un 16% de los investigados que han tenido coito, aseguran haber bebido alcohol antes del acto sexual, asimismo, se acreditó que un 4% han bebido alcohol durante el mismo acto sexual y un 16% han bebido alcohol después del coito. En relación a la aprobación, organización y atrevimiento hacia el primer coito se encontró que un 56% del

total tuvo un primer coito permitido no planeada, los varones poseen mayor predisposición a tener varias parejas sexuales que las damas, asimismo se observa que en las mujeres hay una tendencia a iniciar tardíamente su vida sexual, en semejanza a los varones que dan inicio a su vida sexual tempranamente. De las resultas se puede decir que hay una correspondencia significativa entre la ingesta de alcohol y los comportamientos sexuales de riesgo. La mezcla de alcohol y coito por los adolescentes, aumenta notablemente el coito vaginal, oral y anal en semejanza con aquellos que no beben alcohol. Lo señalado anteriormente influye en embarazos no esperados y en enfermedades de tipo sexual. (pp. 67-68)

Fernández, E., Molerio, O., Sánchez, D., Rodríguez, Y., y Grau, R. (2016), en su investigación: Desarrollo y análisis de confiabilidad del cuestionario para la evaluación de percepción de riesgo sobre el consumo de alcohol en estudiantes universitarios cubanos. *Psychologia. Avances de la disciplina*, 10. Llegaron a las siguientes conclusiones: Se determinaron dos dimensiones, una relacionada con el elemento motivacional-conductual de la sensación de riesgo y la otra con la advertencia acerca de los riesgos del consumo. Las dos dimensiones expresaron altos niveles de confianza y se relacionan con los tres clúster reconocidos de acuerdo con el acomodamiento de la percepción de riesgo en relación a la ingesta de alcohol. Se alcanzó un 84.4% de buena clasificación, sobresaliendo los ítems de la dimensión

motivacional-conductual. El instrumento creado para la estimación de la percepción de riesgo acerca de la ingesta de alcohol en estudiantes universitarios reveló convenientes niveles de seguridad que permite su estudio en este ambiente. (p. 22)

Gallardo, F. (2016), investigó acerca de: Riesgos y consecuencias de las prácticas sexuales en los adolescentes de Juigalpa, bajo los efectos de alcohol y otras drogas, Chontales, Nicaragua. Revista Científica de FAREM-Estelí, (9). Llegó a las siguientes conclusiones: Los adolescentes en la variable sexualidad activa una minoría señala que ha iniciado su vida sexual, pero una mayoría no lo han experimentado debido a diversos factores entre ellos situaciones de orden social como la familia. En la variable edad de inicio sexual según sexo, los varones inician antes y las mujeres después, pero uno y otro están expuestos a riesgos de una vida sexual sin cuidados. En la variable cantidad de individuos con quien ha tenido coito según sexo, las mujeres presentan el menor porcentaje, mientras que el sexo masculino el porcentaje es mayor debido al libertinaje, sólo un 6% manifiesta que ha mantenido coito con más individuos. Los adolescentes de Juigalpa hacen uso de poca droga para el coito, la mayoría usa preservativo en el coito lo que indica un nivel de conciencia para evitar enfermedades y embarazos. Existen pocos casos de enfermedad de transmisión sexual, de 340 adolescentes solo 10 afirman haber contraído una enfermedad de transmisión sexual. (p. 71)

Moure, L., Doallo, S., Salvadores, P., Corral, M., Cadaveira, F., y Caamaño F. (2016), investigaron acerca del: Consumo intensivo de alcohol y cannabis, y prácticas sexuales de riesgo en estudiantes universitarios. *Gaceta Sanitaria*, 30(6). Llegaron a concluir lo siguiente: Los sucesos de sexo bajo la influencia del alcohol fue del 40,9% y 53,0%, y las de sexo sin condón del 13,7% y el 25,7%, para féminas y varones, correspondientemente. La ingesta intensa de alcohol y el uso de cannabis se encuentran asociados al sexo bajo el predominio del alcohol en proporción a féminas y a varones. El consumo de cannabis en las féminas se asoció al coito sin profiláctico. El sexo bajo el predominio de la ingesta intensa de alcohol fue del 24,7% en las mujeres y del 52,9% en los varones. La ingesta intensa de alcohol y el consumo de cannabis son problemas de salud pública porque se encuentran relacionados a muchos problemas entre ellos las prácticas sexuales de riesgo. Las resultas nos sugieren que las prácticas de sexo no seguro se evitarían si se reduce la ingesta de alcohol. (p. 438)

Gutiérrez, M., Munera, X., y Sepúlveda, L. (2017), investigaron acerca de los: Factores de riesgo y de protección asociados al consumo de alcohol en adolescentes. *Revista Electrónica Psyconex*, 8(12). Llegando a las siguientes conclusiones: La ingesta de alcohol es relevante debido a que durante la adolescencia se convierte en un inductor para que se ingieran otro tipos de

sustancias psicoactivas, muchos más aversivas para jóvenes que aún se encuentran en procesos de desarrollo. Es importante implementar y realizar proyectos de promoción y prevención en colegios y otras entidades acerca de este tema, antes de que los jóvenes inicien la adolescencia o al iniciarla, para impedir que la ingesta de alcohol se transforme en problemática durante esta etapa o en un hábito, en edades superiores. (p. 9)

Villafañe, L., y González, R. (2017), en su investigación: Comportamientos de riesgo y nivel de conocimiento de infecciones de transmisión sexual en estudiantes universitarios. Duazary: Revista Internacional de Ciencias de la Salud, 14(2). Llegaron a las siguientes conclusiones: El 78,1 % de los universitarios encuestados ha mantenido relaciones coitales. El 55 % bebe alcohol antes del coito. Las estadísticas muestran la relación entre infecciones de transmisión sexual y el consumo de drogas. No existe relación estadística entre comportamientos de riesgo y nivel de conocimiento. Los resultados de la investigación demuestran que hay necesidad de ejecutar la prevención para producir cambios en la conducta para disminuir el peligro de transmisión enfermedades producidas por el contacto sexual. (p. 162)

García, M., Borasino, P., y Amaya, E. (2011), Investigaron acerca de las: Conductas sexuales de riesgo post consumo de alcohol y/o drogas ilegales en estudiantes de carreras no médicas de la universidad Los Ángeles de Chimbote, centro académico Sullana, durante diciembre 2008-2009. Revista peruana de Drogodependencias, 7(1). Llegando a las siguientes conclusiones: La influencia de la ingesta de alcohol fue de 89,6% y 21,4% para drogas ilegales. La predominancia de coito sin seguridad, baja ingesta de alcohol del 12% y de 17% bajo drogas ilícitas. La predominancia de coito con parejas del mismo sexo como consecuencia de alcohol y drogas ilícitas fue de 2,3% y 1,8% correspondientemente. La predominancia de coito con prostitutas como producto de los efectos de alcohol y drogas ilícitas fue de 1,6% y 2,9% correspondientemente. Tener coito con parejas fortuitas como consecuencia del alcohol fue de 5% y bajo el efecto de drogas ilícitas fue de 6,5%. Entre los consumidores, el 30,4% obtuvo coito sin uso de profiláctico como consecuencia de la ingesta de alcohol y 82,9% bajo el uso de drogas ilícitas. (p. 83)

Mamani, A., y Silva, J. (2012), realizaron una investigación acerca del: Consumo de alcohol y conductas sexuales de riesgo en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Nacional N°72 “San Martín de Porres” UGEL N°03 Magdalena del Mar-Perú. Marzo-diciembre del 2012. Llegando a las siguientes conclusiones: Se halló que la ingesta de bebidas alcohólicas

está asociada al coito y la edad de inicio del coito. Se halló relación significativa entre la ingesta de alcohol con el coito en varones y mujeres; y según año de estudio en 3º año y 5º año. Asimismo se halló relación significativa entre la ingesta de alcohol con la edad de inicio del coito en los varones. Se halló relación entre la ingesta de alcohol con el coito y la edad de inicio del coito. (p. 6)

Ortiz, M., Valentín, J., Pérez, V., y Zúñiga, A. (2015), en su investigación acerca de: Asociación entre consumo de alcohol y relaciones sexuales ocasionales en los adolescentes. *Rev. enferm. herediana*, 8(2). Llegaron a las siguientes conclusiones: “El 87,3% bebieron alcohol y el 83,8% tuvieron coito de forma ocasional. De la interrelación de estas variables se pudo determinar que la tesis es relevante. Se halló relación entre ingesta de alcohol y relaciones coitales fortuitas en adolescentes” (p. 109).

Trujillo, J. (2015), investigó acerca de las: Expectativas sobre el consumo de alcohol y conductas sexuales riesgosas en jóvenes estudiantes. Y llegó a las siguientes conclusiones: Estas señalan que las perspectivas individuales y eficaces se agrupan efectivamente en las relaciones coitales bajo las consecuencias del alcohol, tal con mantener coito con prostitutas bajo la ingesta del alcohol. En la situación de los varones, estos vínculos son más

elevados y se halla una relación con la utilización de profiláctico en el último año y las relaciones coitales fortuitas. Las perspectivas cognoscitivas y motoras eficaces se corresponden de modo contrario con tener coito con prostitutas y el sexo fortuito. (p. 5)

Rafael Chávez, M. (2016), en su investigación acerca de: Relación entre funcionalidad familiar y comportamiento sexual de riesgo en adolescentes del Instituto Materno Perinatal en el periodo febrero de 2016. Llegando a las siguientes conclusiones: El promedio de edad de los jóvenes fue 16,9 años, de los cuales los menores de edad fueron el 58,8%, y mujeres el 98,3% y de educación secundaria el 96,6%. Los jóvenes con familias disfuncionales equivalen al 81,4%. Se halló que la cantidad de parejas sexuales es igual o mayor a dos, las relaciones coitales con el uso paralelo de drogas o alcohol y poseer una práctica sexual madura no se relacionaron a la disfuncionalidad familiar; entretanto que la utilización de anticonceptivos de barrera, haber mostrado cualquier infección de transmisión sexual y una edad menor de inicio del coito si se relaciona con la familia disfuncional. (p. VII)

Coaquira, E., y Arroyo, Y. (2017), realizaron una investigación acerca del: Funcionamiento familiar y consumo de alcohol relacionado al inicio

sexual en estudiantes mujeres del 3ro, 4to y 5to de secundaria de un colegio nacional en el departamento de Junín, 2016-2017. Llegando a las siguientes conclusiones: A través del estadígrafo chi-cuadrado se demostró que hay correspondencia entre el funcionamiento familiar y el primer coito, entre la ingesta de alcohol y el primer coito y entre el funcionamiento familiar y la ingesta de alcohol. En consecuencia si hay correspondencia entre las variables de la investigación. (p. XII)

En la investigación se coincide con las tesis de los extranjeros: Eguía, J. (2015); Isorna, M., Fariña, F., Sierra, J. C., y Vallejo, P. (2015); Ayala, L., Canabal, A., y Fuentes, S. (2016); Fernández, E., Molerio, O., Sánchez, D., Rodríguez, Y., Grau, R. (2016); Gallardo, F. (2016); Moure, L., Doallo, S., Salvadores, P., Corral, M., Cadaveira, F., y Caamaño F. (2016); Gutiérrez, M., Munera, X., y Sepúlveda, . (2017); Villafañe, L., y González, R. (2017); y los connacionales: García, M., Borasino, P., y Amaya, E. (2011); Mamani, A., y Silva, J. (2012); Ortiz, M., Valentín, J., Pérez, V., y Zúñiga, A. (2015); Trujillo, J. (2015); Rafael Chávez, M. (2016); Coaquira, E., y Arroyo, Y. (2017), quienes expresan que hay correlación altamente significativa entre consumo de alcohol y conductas sexuales de riesgo, tanto en la muestra de varones como en la de mujeres.

## CONCLUSIONES

De las pruebas realizadas podemos concluir:

- 1. PRIMERA:** Existe relación entre el consumo de bebidas alcohólicas y las conductas sexuales de riesgo en los estudiantes del octavo ciclo 2017 I de la Especialidad de Ciencias Sociales y Turismo de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión – Huacho, debido a que la prueba de Chi cuadrado muestra un valor de 18,185 y un p valor  $\leq 0,05$ .
- 2. SEGUNDA:** Existe relación entre el consumo de bebidas alcohólicas y el sexo de los estudiantes del octavo ciclo 2017 I de la Especialidad de Ciencias Sociales y Turismo de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión – Huacho, ya que el valor  $p < 0,05$ .
- 3. TERCERA:** Existe relación entre el consumo de bebidas alcohólicas y el estado civil de los estudiantes del octavo ciclo 2017 I de la Especialidad de Ciencias Sociales y Turismo de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión – Huacho, ya que el valor  $p < 0,05$ .

4. **CUARTA:** No existe relación entre el consumo de bebidas alcohólicas y la condición que si actualmente tienen enamorado los estudiantes del octavo ciclo 2017 I de la Especialidad de Ciencias Sociales y Turismo de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión – Huacho, ya que el valor  $p > 0,05$ .

## **RECOMENDACIONES**

1. A partir de los resultados se debe de comprometer a participar en la problemática del consumo de alcohol y conductas sexuales de riesgo en estudiantes en la facultad, para ello se debe de diseñar estrategias con la intención de desplegar en los estudiantes habilidades sociales que permitan su desarrollo holístico.
2. A nivel de la facultad de educación, se debe de trabajar a través de los equipos multidisciplinarios, para motivar a los estudiantes a que participen en talleres destinados a evitar el consumo de alcohol y conductas sexuales de riesgo para así de esta manera perfeccionar su relación con la vida y la sociedad.

3. Se pide que en la facultad se aproveche las horas libres y los primeros 10 minutos de las clases para que con los docentes tutores y docentes de asignaturas identifiquen las diversas problemáticas y de esa manera brindarles orientación especializada con la participación de los equipos interdisciplinarios (docentes, psicólogos, sociólogos y trabajadoras sociales).

## **.1 Bibliografía**

Arkowitz, H. H. (1978). *Treatment strategies for dating anxiety in college men based on real-life practice.* , . New York: The Counseling Psychologist.

Ayala, L. C. (2016). *Tesis: Consumo problemático alcohol, conductas de riesgo sexual y búsqueda de sensaciones en estudiantes de primer semestre de una universidad privada.* Cartagena: Genesis.

Burke, S. &. (1999). *Social anxiety and drinking in college students: A social cognitive theory analysis.* . New York: Clinical Psychological Review, .

Ceballos Ospino GA, Rodríguez De Ávila U. Relación entre el consumo de alcohol y relaciones sexuales en adolescentes. *Revista Duazary* [Internet]. 2016 jul-dic [citado 2016 Oct 25]; 13(2): 76-78. Disponible en:<http://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/duazary/article/view/1724>

- Chavez, R. (2016). *Tesis: Relación entre funcionalidad familiar y comportamiento sexual de riesgo en adolescentes del Instituto Materno Perinatal en el periodo febrero de 2016*. Lima: UNMSM.
- Coaquira, E. y. (2017). *Tesis: Funcionamiento familiar y consumo de alcohol relacionado al inicio sexual en estudiantes mujeres del 3ro, 4to y 5to de secundaria* . Junin: UNC.
- Eguía, J. (2015). *Tesis : Consumo de drogas ilegales y conductas sexuales de riesgo en estudiantes universitarios*. España: Universo.
- Fernández, E. M. (2016). *Tesis: Desarrollo y análisis de confiabilidad del cuestionario para la evaluación de percepción de riesgo sobre el consumo de alcohol en estudiantes universitarios cubanos*. Cuba: La Habana.
- Gallardo, F. (2016). *Tesis: Riesgos y consecuencias de las prácticas sexuales en los adolescentes de Juigalpa, bajo los efectos de alcohol y otras drogas, Chontales, Nicaragua*. . Nicaragua: FAREM-Estelí.
- García, E. M. (2012). *Sexualidad, Anticoncepción y Conducta Sexual de Riesgo en Adolescentes*. New York: International Journal of Psychological Research,.

García, M. B. (2011). *Tesis: Conductas sexuales de riesgo post consumo de alcohol y/o drogas ilegales en estudiantes de carreras no médicas de la universidad Los Ángeles de Chimbote*. Chimbote: ULADECH.

Gómez M, S. L. (2014). *Medio social y uso simultáneo de alcohol y tabaco en estudiantes universitarios de pregrado de carreras de ciencias de la salud de una universidad*. Colombia.: Cundinamarca.

Gual, A. A. (2008). *Alcohol y atención primaria de la salud: informaciones clínicas básicas para la identificación y el manejo de riesgos y problemas*. Washington: OPS.

Gutiérrez, M. M. (2017). *Tesis: Factores de riesgo y de protección asociados al consumo de alcohol en adolescentes*. Colombia: Psyconex, .

Isorna, M. F. (2015). *Tesis : Conductas sexuales de riesgo y drogas facilitadoras del asalto sexual en jóvenes españoles. Suma psicológica*. España: Mercurio.

Londoño, C. G. (2005). *Expectativas frente al consumo de alcohol en jóvenes universitarios colombianos*. España: Anales de Psicología.

Mamani, A. y. (2012). *Tesis Consumo de alcohol y conductas sexuales de riesgo en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Nacional N°72*. Lima: San Martín de Porres.

Moure, L. D. (2016). *Tesis: Consumo intensivo de alcohol y cannabis, y prácticas sexuales de riesgo en estudiantes universitarios*. España: Gaceta Sanitaria, .

OMS. (2016). *Salud de los adolescentes-consumo nocivo del alcohol*. Washington: OMS.

Ortiz, M. V. (2015). *Tesis: Asociación entre consumo de alcohol y relaciones sexuales ocasionales en los adolescentes*. Perú.: enferm. herediana, .

Peugh, J. &. (2001). *Alcohol, drugs and sexual function*. New York: Psychoactive Drugs, .

Pons, J. y. (1999). *El consumo abusivo de alcohol en la adolescencia: un modelo explicativo desde la psicología social*. Lima: Ministerio del Interior, Plan Nacional sobre Drogas.

Sánchez J., S. A. (2013). *Relación entre la edad de debut sexual y el sexo bajo los efectos de las drogas en la adolescencia*. España: Drogodependencias. .

Trujillo, J. (2015). *Tesis: Expectativas sobre el consumo de alcohol y conductas sexuales riesgosas en jóvenes estudiantes*. Peru: Amazonas.

Villafañe, L. y. (2017). *Tesis: Comportamientos de riesgo y nivel de conocimiento de infecciones de transmisión sexual en estudiantes universitarios*. Duazary. Colombia: Ciencias de la Salud.

Weinstock, H., & Berman, S. &. (2004). *Sexually transmitted diseases among American youth: Incidence and prevalence estimates 2000*. New York: Perspectives on Sexual and Reproductive Health.

## **Anexos**

## Anexo 01: Matriz de Consistencia

**TITULO:** Consumo de alcohol y conductas sexuales de riesgo en los estudiantes del octavo ciclo 2017 I de la especialidad de Ciencias Sociales y Turismo de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión – Huacho.

<b>PROBLEMA</b>	<b>OBJETIVO</b>	<b>Hipótesis</b>	<b>Variables</b>	<b>Dimensiones</b>	<b>Metodología</b>
<p><b>PROBLEMA GENERAL</b></p> <p>¿Cuál es la asociación del consumo de bebidas alcohólicas y las conductas sexuales de riesgo en los estudiantes del octavo ciclo 2017 I de la Especialidad de Ciencias Sociales y Turismo de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión – Huacho?</p> <p><b>PROBLEMA ESPECÍFICOS</b></p> <p>¿Existe alguna relación entre el consumo de bebidas alcohólicas con el sexo de los estudiantes del octavo ciclo 2017 I de la Especialidad de Ciencias Sociales y Turismo de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión – Huacho?</p> <p>¿Existe alguna relación entre el consumo de bebidas alcohólicas con el estado civil de los estudiantes del octavo ciclo 2017 I</p>	<p><b>OBJETIVO GENERAL</b></p> <p>Determinar la asociación del consumo de bebidas alcohólicas y las conductas sexuales de riesgo en los estudiantes del octavo ciclo 2017 I de la Especialidad de Ciencias Sociales y Turismo de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión – Huacho.</p> <p><b>OBJETIVOS GENERALES</b></p> <p>Identificar la relación entre el consumo de bebidas alcohólicas con el sexo de los estudiantes del octavo ciclo 2017 I de la Especialidad de Ciencias Sociales y Turismo de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión – Huacho.</p> <p>Identificar la relación entre el consumo de bebidas alcohólicas con el estado civil de los estudiantes del octavo ciclo 2017 I de</p>	<p><b>HIPÓTESIS GENERAL</b></p> <p>El consumo de bebidas alcohólicas se asocia con las conductas sexuales de riesgo en los estudiantes del octavo ciclo 2017 I de la Especialidad de Ciencias Sociales y Turismo de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión – Huacho</p> <p><b>HIPÓTESIS ESPECÍFICOS</b></p> <p>El consumo de bebidas alcohólicas se relaciona con el sexo de los estudiantes del octavo ciclo 2017 I de la Especialidad de Ciencias Sociales y Turismo de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión – Huacho.</p> <p>El consumo de bebidas alcohólicas se relaciona con el estado civil de los estudiantes del octavo ciclo 2017 I de la Especialidad de Ciencias Sociales</p>	<p><b>VARIABLE INDEPENDIENTE</b></p> <p>Consumo de Alcohol</p> <p><b>VARIABLE DEPENDIENTE</b></p> <p>Conductas sexuales de riesgo</p>	<p>Social</p> <p><b>Indicadores</b></p> <p>- Niveles de Riesgo</p> <p><b>Personal</b></p> <p><u>Indicadores</u></p> <p>- Edad de la primera relación sexual</p>	<p><b>TIPO:</b> Básico</p> <p><b>DISEÑO:</b> No Experimental</p> <p><b>NIVEL:</b> Descriptivo</p> <p><b>ENFOQUE:</b> Cuantitativo</p> <p><b>POBLACIÓN:</b> 94estudiantes del nivel secundario</p>

<p>de la Especialidad de Ciencias Sociales y Turismo de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión – Huacho?</p> <p>¿Existe alguna relación entre el consumo de bebidas alcohólicas con la condición que si actualmente tienen enamorado los estudiantes del octavo ciclo 2017 I de la Especialidad de Ciencias Sociales y Turismo de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión – Huacho?.</p>	<p>la Especialidad de Ciencias Sociales y Turismo de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión – Huacho.</p> <p>Identificar la relación entre el consumo de bebidas alcohólicas con la condición que si actualmente tienen enamorado los estudiantes del octavo ciclo 2017 I de la Especialidad de Ciencias Sociales y Turismo de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión – Huacho</p>	<p>y Turismo de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión – Huacho.</p> <p>El consumo de bebidas alcohólicas se relaciona con la condición que si actualmente tienen enamorado los estudiantes del octavo ciclo 2017 I de la Especialidad de Ciencias Sociales y Turismo de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión – Huacho</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Frecuencia de relaciones sexuales</li> <li>- Uso del condón</li> <li>- Número de parejas sexuales</li> <li>- Relaciones sexuales fugaces</li> <li>Relaciones coitales vía anal u oral</li> </ul>	
---	--	--	--	---	--



**UNIVERSIDAD NACIONAL  
JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN  
FACULTAD DE EDUCACIÓN**

**ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN  
SECUNDARIA**

**ESPECIALIDAD DE CIENCIAS SOCIALES Y TURISMO**

**TEST DE IDENTIFICACIÓN DE TRASTORNOS POR CONSUMO  
DE ALCOHOL**

**Traducido y adaptado de: Babor, T. et al. (2001). AUDIT. The Alcohol Use**

**Disorders Identification Test. Guidelines for Use in Primary Care (2ª**

**edición). OMS.**

**INTRUCCIONES:** Debido a que el uso del alcohol puede afectar su salud e interferir con ciertos medicamentos y tratamientos, es importante que le hagamos algunas preguntas sobre su uso del alcohol. Sus respuestas serán confidenciales, así que sea honesto por favor. Marque una X en el cuadro que mejor describa su respuesta a cada pregunta.

	<b>PREGUNTAS</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>PUNTAJE</b>
1	¿Con qué frecuencia consume una bebida alcohólica	Nunca	1 o menos veces al mes	De 2 a 4 veces al mes	De 2 a 3 veces a la semana	4 o más veces a la semana	
2	¿Cuántos TRAGOS de alcohol sueles tomar en un día de consumo normal?	1 o 2	3 o 4	5 o 6	7, 8 o 9	10 o más	

3	¿Con qué frecuencia toma 5 o más TRAGOS en un solo día?	Nunca	Menos de una vez al mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario o casi a diario	
4	En el curso del último año, ¿Con qué frecuencia ha sido incapaz de parar de beber una vez que había empezado?	Nunca	Menos de una vez al mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario o casi a diario	
5	En el curso del último año, ¿Con qué frecuencia no pudo hacer lo que se esperaba de usted porque había bebido?	Nunca	Menos de una vez al mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario o casi a diario	
6	En el curso del último año, ¿Con qué frecuencia ha necesitado beber en ayunas para recuperarse después de haber bebido mucho el día anterior?	Nunca	Menos de una vez al mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario o casi a diario	
7	En el curso del último año, ¿Con qué frecuencia ha tenido remordimientos o sentimientos de culpa después de haber bebido?	Nunca	Menos de una vez al mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario o casi a diario	
8	En el curso del último año, ¿Con qué frecuencia no ha podido recordar lo que sucedió la noche	Nunca	Menos de una vez al mes	Mensualmente	Semanalmente	A diario o casi a diario	

	anterior porque había estado bebiendo?						
9	¿Usted o alguna otra persona ha resultado herido porque usted había bebido?	No		Sí, pero no el curso del último año		Sí, el último año	
10	¿Algún familiar, amigo, médico o profesional de la salud ha mostrado preocupación por su consumo de bebidas alcohólicas o le han sugerido que deje de beber?	No		Sí, pero no el curso del último año		Sí, el último año	

Fíjate si respondiste el total de las preguntas. Gracias por tu colaboración



- 
08. ¿En los 6 últimos meses con qué frecuencia tuviste relaciones sexuales?:
- a) Ninguna vez.
  - b) De 1 a 4 veces.
  - c) De 5 a 8 veces.
  - d) De 9 a 16 veces.
  - e) Más de 16 veces.
09. ¿Cuántas parejas sexuales has tenido en los 6 últimos meses?
- a) 1-3
  - b) 4-6
  - c) >6
10. En los seis últimos meses ¿Has tenido relaciones sexuales con alguien que hayas conocido en el momento? (Por ejemplo en un fiesta o reunión)
- a) Si
  - b) No
11. ¿Cuando tienes relaciones sexuales usas preservativo (condón)?:
- a) nunca
  - b) Ocasionalmente
  - c) Siempre
12. ¿Has tenido relaciones sexuales vía oral o anal?
- a) Si
  - b) No

Fíjate si respondiste el total de las preguntas. Gracias por tu colaboración

## TABLA DE DATOS

N a	Consumo de alcohol												Comportamiento sexual									
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	ST2	V1	Sexo	E-civil	Enamorado	Rel_coitales	Edad relación	6meses	Parejas	Has tenido	Condón	V2
1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	5	Bajo riesgo	a	C	A	A	15	b	a	b	c	Alto
2	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	6	Bajo riesgo	a	C	a	A	20	b	a	b	c	Alto
3	1	2	0	2	2	2	2	2	2	2	17	Problema o dependencia	b	C	a	A	15	b	a	b	c	Bajo
4	2	3	0	2	0	3	0	0	0	4	14	Riesgo	b	C	a	A	22	b	a	b	c	Bajo
5	1	1	1	1	0	1	0	0	0	2	7	Bajo riesgo	a	C	b	A	22	b	a	b	b	Alto
6	2	2	2	1	0	2	0	0	0	2	11	Riesgo	b	C	b	A	20	c	a	b	c	Bajo
7	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	6	Bajo riesgo	b	B	b	A	18	b	a	b	b	Medio
8	2	2	2	1	2	2	2	2	0	2	17	Problema o dependencia	b	C	b	A	18	b	a	b	c	Bajo
9	2	3	3	3	3	1	3	1	0	0	19	Problema o dependencia	a	C	a	A	18	b	a	b	b	Bajo
10	2	2	0	2	0	0	2	0	2	2	12	Riesgo	b	C	a	B	20	b	a	a	c	Medio

11	2	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	6	Bajo riesgo	a	B	a	A	20	b	a	b	b	Alto
12	1	2	1	0	1	0	0	2	0	2	2	9	Riesgo	a	B	b	A	20	c	a	a	c	Bajo
13	2	2	0	2	2	0	0	0	2	2	2	12	Riesgo	b	C	b	A	20	a	a	b	b	Bajo
14	2	2	0	0	0	1	0	0	0	2	2	7	Bajo riesgo	b	C	a	A	22	b	a	b	a	Alto
15	2	2	2	2	1	2	1	1	0	2	2	15	Riesgo	a	C	a	A	24	b	a	b	a	Bajo
16	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3	Bajo riesgo	b	C	a	B	20	b	b	a	c	Alto
17	1	2	0	0	2	0	1	1	0	2	2	9	Riesgo	a	C	a	A	20	b	a	b	b	Medio
18	1	2	2	1	1	1	1	1	0	0	0	10	Riesgo	a	C	a	a	26	b	a	b	c	Bajo
19	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	6	Bajo riesgo	a	C	a	a	20	d	a	b	b	Alto
20	1	0	1	1	1	1	0	0	0	4	4	9	Riesgo	a	A	a	a	20	b	a	b	c	Bajo
21	2	2	2	1	2	2	2	2	0	2	2	17	Problema o dependencia	b	C	b	a	18	b	a	b	c	Bajo
22	2	3	3	3	3	1	3	1	0	0	0	19	Problema o dependencia	a	C	a	a	18	b	a	b	b	Bajo
23	2	2	0	2	0	0	2	0	2	2	2	12	Riesgo	b	C	a	b	20	b	a	a	c	Medio
24	2	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	6	Bajo riesgo	a	B	a	a	20	b	a	b	b	Alto

25	1	2	1	0	1	0	0	2	0	2	<b>9</b>	Riesgo	a	B	b	a	20	c	a	a	c	Bajo
26	2	2	0	2	2	0	0	0	2	2	<b>12</b>	Riesgo	b	C	b	a	20	a	a	b	b	Bajo
27	2	2	0	0	0	1	0	0	0	2	<b>7</b>	Bajo riesgo	b	C	a	a	22	b	a	b	a	Alto
28	2	2	2	2	1	2	1	1	0	2	<b>15</b>	Riesgo	a	C	a	a	24	b	a	b	a	Bajo
29	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	<b>3</b>	Bajo riesgo	b	C	a	b	20	b	b	a	c	Alto
30	1	2	0	0	2	0	1	1	0	2	<b>9</b>	Riesgo	a	C	a	a	20	b	a	b	b	Medio