

**UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO  
SANCHEZ CARRION  
FACULTAD DE MEDICINA HUMANA  
E.A.P MEDICINA HUMANA**



**TESIS**

***“FACTORES ASOCIADOS A REINTERVENCIONES EN  
CIRUGÍA ABDOMINAL, HOSPITAL REGIONAL DE  
HUACHO, 2006-2011”***

**Tesista:**

Bach. Greck Dickson Ayala Gaspar

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE MÉDICO CIRUJANO

**Asesora:**

Dra. Teresa C. Cano Gonzales

HUACHO – PERÚ

2012

# Resumen

El estudio realizado tuvo como objetivo describir los factores asociados a los pacientes sometidos a reintervenciones en cirugía abdominal, hospital regional de Huacho, 2006-2011.

Para lo cual, se realizó un estudio retrospectivo, transversal de tipo descriptivo siendo 66 pacientes el total de reintervenidos, de los cuales formaron parte del estudio 46 los 20 restantes no cumplieron con los requisitos solicitados.

Siendo el sexo masculino el mas predominante con un 63%, con el 43,5% de pacientes distribuidos por encima de los 60 años. El 73,9% fue programado de emergencia, Se logro determinar que la causa de cirugía más común en ser reintervenida fue la no traumática con un 89,1%, la indicación de re intervención más frecuente en cirugía abdominal la peritonitis generalizada o residual 21,7% de casos, seguida de los abscesos intrabdominales localizados 19,6%, el sangrado digestivo en un 15,2%, la obstrucción intestinal con un 13,0%, y en menor medida las evisceraciones y las dehiscencias de suturas biliodigestivas con un 6,5% cada una. El índice de mortalidad calculado en 15,2% del total de reintervenidos, siendo la causa principal de muerte el shock séptico 71,4% seguido del shock hipovolemico con 14,3%.

**PALABRAS CLAVES:** Factores de riesgo, Cirugía abdominal electiva o de emergencia, reintervenciones quirurgicas