

**UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO
SÁNCHEZ CARRIÓN**

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA



**FACTORES ASOCIADOS A ICTERICIA
NEONATAL PATOLÓGICA EN EL HOSPITAL DE
BARRANCA CAJATAMBO- SBS.ENERO-
DICIEMBRE 2012.**

**AUTOR:
ERICK ROBERTO SERNA LÓPEZ**

**ASESOR(A): RODOLFO, SANCHEZ ALIAGA
Méd. CIRUJANO**

HUACHO-PERU

2014

RESUMEN

Objetivos: Identificar los factores asociados a la aparición de ictericia neonatal patológica en el Hospital de Barranca Cajatambo y SBS de Enero a Diciembre del 2012.

Material y métodos: Se realizó un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo y transversal. Se revisaron 256 historias clínicas de pacientes neonatos que presentaron ictericia neonatal patológica, en el periodo que corresponde al estudio.

Resultados: La media de la edad de las madres fue de 27.2+/-7.2 años, la edad gestacional fluctuó de 38.4+/-1.2 semanas. El peso del recién nacidos fluctuó entre 3251+/-515 gramos. No hubieron neonatos deprimidos. El 52.5% nació de parto vaginal. La mayoría de las madres eran nulíparas (59.8%), y tuvieron grupo O positivo (88.4%). El test de Coombs directo fue positivo en el 17% de los casos. La edad de presentación de la ictericia fue entre las 24 a 72 horas (58.7%).

Conclusiones: Los antecedentes patológicos maternos se asociación significativamente con la aparición de ictericia neonatal patológica en el Hospital de Barranca Cajatambo y SBS de Enero a Diciembre del 2012 ($P < 0.05$). La incidencia de Ictericia Neonatal Patológica fue del 9.4%. No hubo factores de riesgo maternos ni neonatales asociados a la aparición de