

**UNIVERSIDAD NACIONAL “JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ
CARRIÓN”**

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



BORRADOR DE TESIS

PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE MÉDICO CIRUJANO

**EPIDEMIOLOGÍA DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE
BRONQUIOLITIS DEL HOSPITAL BARRANCA-CAJATAMBO-AÑO 2015.**

AUTORES:

ROJAS CARLOS, Julio César

LIBERATO CARMIN, Pitter Darwin

ASESOR:

M. C. SÁNCHEZ ALIAGA, Manuel Rodolfo

HUACHO-PERÚ

2016

RESUMEN:

Con el objetivo de describir las características epidemiológicas de los pacientes con bronquiolitis aguda atendidos en el Hospital Barranca-Cajatambo, desde 1° de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2015. Se realizó un estudio observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo. Las variables fueron: edad, sexo, prematuridad, exposición al tabaco, lactancia materna, bajo peso al nacer, periodo de presentación, manifestaciones clínicas y estancia hospitalaria. Los datos recogidos de las historias clínicas se analizaron con Epi info 7; los gráficos se confeccionaron con el programa Excel 2010. Se analizó 73 casos; los niños menores de 6 meses representaron el 45.21% de los casos, la razón varón vs mujer fué de 1.15:1, la prematuridad en nuestra serie alcanzó el 9.59% de los casos, el 34.25 % de los pacientes con bronquiolitis tiene madre y/o padre fumador, el 41.10% de los pacientes con bronquiolitis (30 casos) tuvo lactancia materna exclusiva los dos primeros meses y un 31.51% de los pacientes con bronquiolitis (23 casos) completó los seis meses de lactancia exclusiva, el 21.92% de los casos tuvo un peso inferior a 2,500 g. al momento de nacer, los meses de abril y mayo fueron los de mayor presentación de casos, las manifestaciones clínicas más frecuentes de nuestra serie son la sibilancia y la tos. El tiempo de estancia hospitalaria más frecuente fue de 1 a 3 días.

Palabras clave: bronquiolitis, epidemiología, pediatría general.