

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL MEDICINA HUMANA



Tesis para obtener el Título Profesional de Médico Cirujano:

**“PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE ICTERICIA NEONATAL EN RECIÉN
NACIDOS HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE
HUACHO, 2014”**

AUTORES:

GABRIELA ARIADNA ISABEL ARCE FERRUFINO

KAREN ALEJANDRINA VELASQUEZ ARQUIÑIGO

ASESOR:

Med. Ciruj. HENRY KEPPLER SANDOVAL PINEDO

HUACHO – PERÚ

2015

RESUMEN

OBJETIVO: determinar el perfil epidemiológico de ictericia neonatal en recién nacidos hospitalizados en el Hospital Regional de Huacho, 2014.

MATERIALES Y MÉTODOS: estudio observacional, retrospectivo, transversal y descriptivo que incluyó 233 recién nacidos hospitalizados por ictericia neonatal en el Hospital Regional de Huacho, 2014.

RESULTADOS: la incidencia de ictericia neonatal en recién nacidos hospitalizados fue 55,6%. Los antecedentes perinatales que predominaron fueron el sexo masculino (56,2%), edad gestacional a término (86,7%), adecuado peso al nacer (79,8%), edad materna de 20 a 34 años (67,4%) y parto vaginal (54,9%). Los datos de hospitalización que predominaron fueron edad al ingreso de 2 a 7 días (73,4%), lactancia materna exclusiva (57,5%). En el 41,6% no se identificó causa específica y predominó el grupo sanguíneo A (78,4%) en recién nacidos con incompatibilidad ABO y presentaron factor RH positivo todos los recién nacidos con incompatibilidad RH.

CONCLUSIÓN: la ictericia neonatal es la primera causa de admisión en el Servicio de Neonatología del Hospital Regional de Huacho, 2014. El perfil epidemiológico de ictericia neonatal es similar al descrito en la literatura.

PALABRAS CLAVES: Ictericia Neonatal; Recién Nacido; incidencia; Perfil Epidemiológico.