

**UNIVERSIDAD NACIONAL  
JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN**



**FACULTAD DE MEDICINA HUMANA  
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA**

**TESIS**

**FACTORES DE RIESGO PARA SEPSIS NEONATAL PRECOZ EN  
PREMATUROS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL REGIONAL  
HUACHO 2014-2016**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE MÉDICO CIRUJANO**

**AUTOR:**

**JHON MARCELO CHAVEZ SAMANAMUD  
DANNY GABRIEL MORALES GOMERO**

**ASESOR**

**M .O. FREDY RUPERTO BERMEJO SANCHEZ**

**HUACHO – 2017**

## RESUMEN

**Objetivo:** Determinar los factores de riesgo para sepsis neonatal precoz en prematuros atendidos en el Hospital Regional Huacho 2014-2016.

**Material y Método:** Investigación observacional, analítico, retrospectivo y transversal. Se evaluaron 240 historias clínicas, distribuidas en grupo caso (80 Neonatos con sepsis neonatal precoz) y grupo control (160 Neonatos sin sepsis neonatal precoz). El análisis estadístico se realizó mediante el Odds Ratio para determinar el nivel de riesgo de los factores, con un nivel de confianza del 95%.

**Resultados:** La edad promedio de las madres de los neonatos con y sin sepsis precoz fue de 25,4 años y 26,2 años, respectivamente. Los factores de riesgo maternos de sepsis neonatal precoz en prematuros fueron: el RPM (OR=9,034; IC=4,00-20,39), el tiempo de latencia de RPM mayor o igual a 18 horas (OR=21,0; IC=3,158-139,663), la corioamnionitis (OR=12,892; IC=1,53-109,02), la fiebre en el parto (OR=3,029; IC=1,167-7,864) y la infección de vías urinarias (OR=5,539; IC=2,856-10,741). El factor de riesgo del parto fue el parto por cesárea (OR=2,714; IC=1,555-4,739). Los factores de riesgo del recién nacido fueron el bajo peso al nacer (OR=3,994; IC=2,245-7,106) y el sexo masculino (OR=2,170; IC=2,242-3,790).

**Conclusión:** La RPM, el tiempo de latencia de RPM mayor o igual a 18 horas, la corioamnionitis, la fiebre materna en el parto, la infección de vías urinarias, el parto por cesárea, el bajo peso al nacer y el sexo masculino del neonato fueron factores de riesgo de sepsis neonatal precoz en prematuros atendidos en el Hospital Regional Huacho 2014-2016.

**Palabras clave:** Sepsis neonatal precoz, prematuridad, factores de riesgo.