

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN



FACULTAD DE MEDICINA HUMANA

ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA

TESIS

**PRINCIPALES PATOLOGÍAS ASOCIADAS AL SÍNDROME DE
DIFICULTAD RESPIRATORIA EN RECIÉN NACIDOS A TÉRMINO EN
EL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE
HUACHO HUAURA OYÓN Y SBS, 2017**

PRESENTADO POR:

Amarilis Karelia Castillo Delagdilto

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE MÉDICO CIRUJANO

ASESOR:

MC. Carlos Overti Suquilanda Flores

HUACHO, 2018

RESUMEN

El **objetivo** del presente trabajo de investigación es determinar las principales patologías asociadas al síndrome de dificultad respiratoria en recién nacidos a término ingresados en el servicio de Neonatología del Hospital Regional de Huacho Huaura Oyón y SBS en el año 2017.

Método: Se realizó un estudio retrospectivo descriptivo transversal observacional, cuya población fue de 38 recién nacidos vivos a término en el servicio de Neonatología con diagnóstico de Síndrome de Dificultad Respiratoria (SDR), en el período comprendido del 1 de Enero hasta 31 de Diciembre del 2017. Para la recolección de datos se confeccionó una Ficha de recolección de datos, en la que se exploraron las variables: edad gestacional, procedencia, controles prenatales (CPN), peso al nacer, sexo, tipo de parto, diagnóstico de SDR.

Resultados: Los resultados encontrados fueron que durante el año 2017 se registraron 3046 nacimientos en el Hospital Regional de Huacho, de los cuales 38 correspondieron a RN a término con diagnóstico de SDR que fueron incluidos en el presente estudio. Se encontró que el 39.5% (15) con TTRN, con un 15.8% (6) el SAM, Sepsis neonatal con 15.8% (6), CCC con 7.9% (3), Depresión al nacer con 7.9% (3), Asfixia perinatal con 5.3% (2); y otras patologías comprendidas entre Neumonía, Hipoglicemia neonatal y CCA que representaron el 7.9%.

Conclusiones: Se concluye que la principal patología asociada al SDR en recién nacido a término fue de origen pulmonar, con la TTRN. En cuanto a las patologías de origen cardiaco, fue la CCC la más prevalente, las de causas neurológicas la Depresión al nacer. Pero existieron de los otros grupos que solo abarcaron una sola patología, como Sepsis neonatal e Hipoglicemia neonatal, de origen infeccioso y metabólico respectivamente.

Palabras claves: Síndrome de Dificultad Respiratoria, recién nacidos a término.