

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN



FACULTAD DE MEDICINA HUMANA

ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA

TESIS

**ESTUDIO COMPARATIVO DE LA INDICACIÓN DE CESÁREAS EN EL
HOSPITAL II GUSTAVO LANATTA LUJAN – ESSALUD Y EL
HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO HUAURA OYON Y SBS,
OCTUBRE-DICIEMBRE 2017**

PRESENTADO POR:

Jardiel Eric Quiñones Minaya

PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE MÉDICO CIRUJANO

ASESOR:

M(O). William Rogelio Peña Ayudante

HUACHO, 2018

RESUMEN

Objetivo: Determinar las principales indicaciones de cesáreas y comparar sus frecuencias en los hospitales del EsSalud y el Minsa, Octubre-Diciembre 2017. **Material y Método:** Se realizó un estudio descriptivo, comparativo, retrospectivo y de corte transversal, cuya muestra está conformada por un total de 263 pacientes del servicio de Obstetricia del Hospital del EsSalud y el Minsa. La información fue recolectada principalmente de las Historias Clínicas y el libro de parto, para ser analizado en el programa informático Microsoft Office Excel 2010. **Resultados:** Se encontró una prevalencia de cesáreas de 35.4% para el EsSalud y un 39,6% para el Minsa, cabe mencionar que excluyendo a los pretérminos y a las preeclampsias-eclampsias la prevalencia resultó ser de 35.18% en el EsSalud y de 35.84% en el Minsa. Las gestantes entre 20 y 35 años son las que con mayor frecuencia se someten a dicha intervención en ambos hospitales. Del total de cesáreas, la principal causa es la materna y dentro de ella está la cesárea anterior con 69.1% en el EsSalud y con 57.9% en el Minsa. En relación a la principal causa fetal fue la macrosomía para el EsSalud con 40% y para el Minsa fue el sufrimiento fetal agudo (SFA) con 32.7% y en relación a la causa ovular la Rotura prematura membranas (RPM) prolongada fue la causa principal para ambos hospitales con 37.5% para el EsSalud y con 46.2% para el Minsa. **Conclusiones:** La prevalencia de cesáreas en el EsSalud fue relativamente menor con 35.4%, con respecto al Minsa con un 39.6%, evidenciándose además que ambos hospitales están por encima de lo estipulado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que es un 10-15%. La principal indicación de cesárea es la cesárea previa, con respecto a la principal indicación fetal es la macrosomía fetal para el EsSalud y el sufrimiento fetal agudo para el Minsa.

Palabras clave: cesárea, causas, fetal, materna, ovular