

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN



**FACULTAD DE MEDICINA HUMANA
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA**

TESIS

**PREVALENCIA Y CARACTERÍSTICAS OBSTÉTRICAS-
NEONATALES DE PARTOS VAGINALES EN CESAREADA
ANTERIOR EN EL HOSPITAL GUSTAVO LANATTA LUJÁN - 2017**

PRESENTADO POR:

Víctor Isaías Rodríguez Domínguez

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE MÉDICO
CIRUJANO**

ASESOR

Mg. Jacinto Jesús Palacios Solano

HUACHO,2018

Resumen

Objetivo: Determinar la prevalencia y características obstétricas-neonatales de partos vaginales en cesareada anterior en el Hospital Gustavo Lanatta Luján 2017.

Materiales y método: Diseñé un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo y transversal. Consideré una población de 202 gestantes que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión, utilicé como instrumento la ficha de recolección de datos y la información obtenida se procesó en el programa SPSS para Windows versión 22.0 Apliqué medidas de dispersión, tendencia central, frecuencia y tablas de contingencia para analizar los datos.

Resultados: Se halló la prevalencia de parto vaginal en cesareada anterior en 26.7%. El 81.48% de gestantes se encontraron entre 20 a 35 años de edad. El 100% de las pacientes tuvieron un periodo intergenésico mayor de 24 meses. Se empleó oxitocina en el 5.5% de pacientes. El 75.92% tuvieron un parto anterior y el 24.08%, más de un parto. El 100% de los recién nacidos tuvieron un puntaje de Apgar mayor de 7 puntos a los 5 minutos. El 87.03% de recién nacidos pesaron entre 2500 y 3999 g, el 12.97% pesaron más de 4000 g.

Conclusiones: En gestantes con antecedentes de cesárea previa la prevalencia del parto vaginal varía mucho de acuerdo al país y a la institución donde se realiza el estudio, sin embargo los resultados de las características obstétricas-neonatales de los casos estudiados guardan una similitud considerable con los antecedentes revisados.

Palabras clave: Prevalencia, parto vaginal, cesárea previa, características obstétricas-neonatales.