

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN



**FACULTAD DE MEDICINA HUMANA
ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA**

TESIS

**FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A BRONQUIOLITIS EN EL
SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL REGIONAL
HUACHO.2107**

PRESENTADO POR:

John Crider León Corpus

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE MÉDICO CIRUJANO

ASESOR:

M.C. Carlos Overti Suquilanda Flores

HUACHO, 2018

RESUMEN

Objetivo: Identificar los Factores de riesgo asociados a Bronquiolitis en el servicio de pediatría del Hospital Regional Huacho. 2017

Material y métodos: Se llevó a cabo un estudio de tipo analítico, observacional, retrospectivo, de casos y controles. La población de estudio estuvo constituida por 200 pacientes niños menores de 2 años según criterios de inclusión y exclusión establecidos distribuidos en dos grupos: con y sin bronquiolitis. Los datos fueron analizados con el paquete estadístico IBM (SPSS) Versión 24, para realizar el análisis estadístico se utilizó la prueba de chi-cuadrado (χ^2) y la estimación del riesgo relativo a través del Odds Ratio con la estimación del intervalo de confianza al 95%.

Resultados: El análisis estadístico sobre las variables en estudio como factores de riesgo fue: el sexo masculino ($\chi^2 = 1,28$; $p > 0,05$; OR = 1,38; IC 95%= 0,79 – 2,43), edad menor de 6 meses ($\chi^2 = 15,70$; $p < 0,05$; OR = 3,167; IC 95% = (1,77 – 5,64), bajo peso de nacimiento ($\chi^2 = 2,0$; $p > 0,05$ (0,15); OR = 0,50; IC 95% = 0,19 – 1,32), parto por cesárea ($\chi^2 = 8,08$; $p < 0,05$; OR = 2,27; IC 95%=1,28 – 4,01), prematuridad ($\chi^2 = 2,09$; $p=0,14$; OR = 1,84; IC 95%= 0,79 – 4,25), crianza de animales domésticos ($\chi^2 = 23,20$; $p < 0,05$; OR = 4,14; IC 95%= 2,29 – 7,49), hacinamiento ($\chi^2 = 29,30$; $p < 0,05$; OR = 5,89; IC 95%= 3,0 – 11,57), estado nutricional ($\chi^2 = 0,22$; $p > 0,05$ (0,63); OR = 1,25; IC 95%= 0,49 – 3,16), lactancia materna no exclusiva ($\chi^2 = 14,65$; $p < 0,05$; OR = 3,04; IC 95%= 1,70 – 5,42).

Conclusión: La edad menor a 6 meses, el parto por cesárea, la crianza de animales domésticos, el hacinamiento y la lactancia materna no exclusiva son factores de riesgo asociados a Bronquiolitis en el servicio de Pediatría del Hospital Regional de Huacho. 2017

Palabras clave: Factores de riesgo, Bronquiolitis.