

**UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN**

**FACULTAD DE MEDICINA HUMANA**

**Escuela Académico Profesional de Medicina Humana**



**TESIS PARA OBTAR EL TITULO PROFESIONAL DE MÉDICO CIRUJANO**

**“FACTORES ASOCIADOS DE LA APENDICITIS AGUDACOMPLICADA EN  
PACIENTES DE 15 A 60 AÑOS EN EL HOSPITAL MARINO MOLINA  
SCCIPA- 2011”**

**Autora: Bach. Jely Lorena, Yánac Sosa**

**Asesora: Dra. Teresa Catalina, Cano González**

**Huacho – Perú**

**2012**

## RESUMEN

### **FACTORES ASOCIADOS DE LA APENDICITIS AGUDA COMPLICADA EN PACIENTES DE 15 A 60 AÑOS EN EL HOSPITAL MARINO MOLINA SCCIPA – 2011**

**OBJETIVO:** La investigación estuvo orientada a determinar cuales son los factores asociados de las apendicitis agudas complicadas en pacientes de 15 a 60 años en el Hospital Marino Molina Sccipa, en el periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2011. **MATERIAL Y METODOS:** Estudio observacional, analítico, retrospectivo de corte transversal caracterizado por la recolección de la información en las historias clínicas de los pacientes respecto a un mismo fenómeno de interés. La muestra seleccionada estuvo comprendida por 220 pacientes. Los instrumentos empleados estuvieron conformados por una ficha de recolección de datos convenientemente elaborada para los fines de estudio. **RESULTADOS:** Se encontró asociación estadística significativa a la presentación de la apendicitis aguda complicada: Con el tiempo de enfermedad extrahospitalaria ( $p=0,001$ ) siendo el tiempo  $> 24$  horas  $RR=1,36$ (IC:1,22 – 1,52); con el tiempo de espera intrahospitalario( $p=0,001$ )siendo el tiempo  $>12$ horas  $RR=1,30$ (IC:1,12 – 1,52); con el tiempo total de enfermedad ( $p=0,001$ ) siendo el tiempo  $>48$  horas  $RR:1,37$ (IC:1,14 – 1,63); con el hemograma( $p=0,025$ )siendo la leucocitosis con y sin desviación ala izquierda  $RR=1,17$ (IC:1,02 – 1,33). No se encontró asociación estadística significativa a la presentación de la apendicitis aguda complicada: Con el sexo( $p=0,880$ )con la edad( $p=0,723$ )así como con la medicación previa( $p=0,278$ ). **CONCLUSIÓN:** Se concluye en el estudio que existe una asociación estadísticamente significativa para la presentación de la apendicitis aguda con un efecto de desventaja: con el tiempo de enfermedad mayor a 24 horas; el tiempo de espera mayor a 12 horas, con el tiempo total de enfermedad mayor de 48 horas y con leucocitosis con o sin desviación izquierda.

**Palabras clave:** Apendicitis aguda complicada, factores de riesgo